

# 複素数と Mathematica

桂田 祐史

2015年9月28日, 2016年9月15日

<http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/complex/mathematica-memo/>

## 1 四則など簡単な演算

虚数単位は  $I$  で表す。絶対値 (absolute value) は `Abs[]`, 偏角 (argument) の主値は `Arg[]`, 共役複素数 (complex conjugate) は `Conjugate[]` で計算できる。

問 1<sup>1</sup> (1) の検算に使ってみる。

```
a=1+I
b=2+3I
a+b
a-b
a b
a/b
Abs[a]
Conjugate[a]
Arg[a]
a^4
```

## 2 平方根の計算

$c = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) が与えられた時に、 $z^2 = c$  の解を  $z = x + iy$  ( $x, y \in \mathbb{R}$ ) の形で求めることができる。

(複素数の平方根が、実数の  $\sqrt{\quad}$  で表現できる、という定理に基づく。)

$(x + iy)^2 = a + ib$  より連立方程式

$$x^2 - y^2 = a, \quad 2xy = b$$

が得られるので、その実数の範囲の解を求めれば良い。

---

<sup>1</sup><http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/complex-function-2015/toi1.pdf>

```

a=1
b=1
sol=Solve[{x^2-y^2==a,2 x y==b},{x,y},Reals]
FullSimplify[sol]

```

以上は授業で説明したやり方に沿って Mathematica に仕事をさせるものだが、 $z$  の方程式のまま解かせることも出来る (Mathematica が内部で何をしているのかは謎だけど)。

```

sol=Solve[z^2 == 1 + I, z]
sol2=ComplexExpand[sol]
ToRadicals[sol2]

```

最初に  $z^2 = 1 + i$  を解かせると  $z = \pm\sqrt{1+i}$  となるが、ComplexExpand[] で実部・虚部に展開させると、 $z = \pm\sqrt[4]{2} \left( \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$  となり、ToRadicals[] で処理すると、 $z = \pm \left( \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2^{3/4}} + i \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2^{3/4}} \right)$  となる。

### 3 実部虚部への分解

$\Omega \subset \mathbb{C}$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  とするとき、

$$u(x, y) := \operatorname{Re} f(x + iy), \quad v(x, y) := \operatorname{Im} f(x + iy) \quad ((x, y) \in \tilde{\Omega} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + iy \in \Omega\})$$

で定めた  $u, v$  が必要になる場合がある。

既に紹介した ComplexExpand[] を用いると良い。

```

f[z_]:=z^3
ComplexExpand[f[x+I y]]

g[z_]:=Cos[z]
ComplexExpand[g[x+I y]]

```

### 4 (有限項) Taylor 展開

有限項まで打ち切ったものしか計算出来ないが、Series[式, {変数, c, n}] で、 $c$  のまわりの Taylor 展開を第  $n$  項まで計算出来る。

```

Series[Cos[z],{z,0,10}]

Series[1/(2+z),{z,0,10}]

```

## 5 級数

Mathematica の `Sum[]` は級数の和を計算してくれる。思いの外、強力である。

```
Sum[(-1)^n z^n/(2n!),{n,0,Infinity}]
```

に対して `Cos[z]` という答を返す。

Taylor 展開、Laurent 展開は、ある程度、自分で計算する必要があるようだが、その結果を `Sum[]` に与えることで検算が可能である。

## 6 部分分数分解

有理式の部分分数への分解が必要になる場合があるが、`Apart[]` で計算できる。

```
Apart[(z^3-3z^2-z+5)/(z^2-5z+6)]
```

## 7 応用: ある計算問題 (有理関数の Taylor 展開を求める) の答の検算

$$f(z) = \frac{z^3 - 3z^2 - z + 5}{z^2 - 5z + 6}.$$

の 0 の周りの Taylor 展開を求めよ、という問題。

人手で解く場合は、 $f(z)$  を部分分数に分解する。そのためには、 $z^3 - 3z^2 - z + 5$  を  $z^2 - 5z + 6$  で割りたくなる。

```
A=z^3-3z^2-z+5
```

```
B=z^2-5z+6
```

```
f=A/B
```

```
q=PolynomialQuotient[A,B,z]
```

```
r=PolynomialRemainder[A,B,z]
```

これから商  $q = z + 2$ , 余り  $r = 3z - 7$  が求まる (商は quotient, 余りは remainder. polynomial は多項式という意味)。ゆえに

$$f(z) = \frac{(z+2)(z^2-5z+6) + 3z-7}{z^2-5z+6} = z+2 + \frac{3z-7}{(z-2)(z-3)}.$$

この右辺を部分分数分解しても良いが、そもそも Mathematica にやらせるのならば、最初から  $f(z)$  の部分分数分解を指示してもよい。

```
Apart[r/B]
```

```
Apart[f]
```

それぞれ  $\frac{2}{-3+z} + \frac{1}{-2+z}$ ,  $2 + \frac{2}{-3+z} + \frac{1}{-2+z} + z$  となる。

結局

$$f(z) = z + 2 + \frac{1}{z-2} + \frac{2}{z-3}.$$

`Series[f, {z, 0, 10}]` とすると、0 の周りの Taylor 展開を 10 次の項まで求めることが出来る。

$$f(z) = \frac{5}{6} + \frac{19z}{36} - \frac{43}{216}z^2 - \frac{113}{1296}z^3 - \frac{307}{7776}z^4 - \dots (\text{途中省略}) - \dots - \frac{181243}{362797056}z^{10} + O(z^{11})$$

が得られる。series は級数という意味の英単語である。

残念ながら、Mathematica で Taylor 展開の一般項を求めるための簡単な手段は用意されていないようである。

人手で計算して、

$$f(z) = \frac{5}{6} + \frac{19}{36}z - \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{2}{3^{n+1}} \right) z^n$$

が求まるが、この結果の検算は可能で

```
5/6+19z/36-Sum[(1/2^(n+1)+2/3^(n+1))z^n,{n,2,Infinity}]
```

```
Simplify[%]
```

とすると、

$$\frac{5 - z - 3z^2 + z^3}{6 - 5z + z^2}$$

が得られる。無事、 $f(z)$  と一致したので、ほっと一息。

## 8 複素対数関数を描く

2変数  $(x, y)$  の関数としての  $\text{Im Log}(x + iy)$ ,  $\text{Re Log}(x + iy)$  のグラフを描いてみよう。

それぞれ  $\text{Arg}(x + iy)$ ,  $\log \sqrt{x^2 + y^2}$  であるから、コンピューターで図示しなくても分からなくはないが(図示しなくても分かるけれど)、やってみることを勧める。

`Plot3D[]` や `ContourPlot[]` では描画範囲は、 $x$  座標,  $y$  座標で指定するので、変数の方は  $x + I y$  と書くと良い(小さなノウハウ)。

```
Plot3D[Boole[x^2+y^2<4] Im[Log[x+I y]],{x,-2,2},{y,-2,2}]
```

```
Plot3D[Boole[x^2+y^2<4] Re[Log[x+I y]],{x,-2,2},{y,-2,2}]
```

(Boole[] はなくても良い。描画範囲を円内に制限しているだけで、あまり深い意味はない。個人的な趣味です。)

Mathematica で描いたグラフはマウスでつかんでグリグリ動かせる。ぜひやってみること (静止面を見るだけだと今ひとつ分かりにくい)。

Plot3D[] の代わりに ContourPlot[] を用いると、レベル表示 (≡等高線描画) 出来る。

## 9 Abel の連続性定理に現れる収束範囲

冪級数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-c)^n$  が収束円周上のある点  $z_0$  で収束するならば、その冪級数は “Stolz の角領域” で一様収束するので、和はそこで連続な関数である、というのが Abel の連続性定理で、それにより、

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \dots$$

などの有名な結果が証明できる。

例えば  $c=0, z_0=R$  の場合、

$$\Omega_K := \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z| < R, \frac{|1-z/R|}{1-|z|/R} < K \right\}$$

であるが、これは一体どういう形なのだろうか？

```

stolz[K_, R_] :=
Block[{g1, g2},
g1 = ContourPlot[x^2 + y^2 == R^2, {x, -2 R, 2 R}, {y, -2 R, 2 R}];
g2 = RegionPlot[
x^2 + y^2 < R^2 &&
Abs[1 - (x + I y)/R]/(1 - Abs[x + I y]/R) <= K, {x, -2 R,
2 R}, {y, -2 R, 2 R}]; Show[g1, g2]
]

R=1
Manipulate[stolz[K,R],{K,1,10,0.2}]

```

## 10 曲線の連続的な変形 (ホモトピー)

円を楕円に変形する。




図 1:  $K$  を大きくすると膨れていきます

```

phi0[t_]:= {Cos[t], Sin[t]};

phi1[t_]:= {3Cos[t], 2Sin[t]};

F[t_, u_]:= (1-u)phi0[t]+u*phi1[t];

Manipulate[ParametricPlot[{phi0[t], phi1[t], F[t, u]}, {t, 0, 2 Pi},
  PlotRange -> {{-3, 3}, {-3, 3}}, {u, 0, 1}]

```

phi1[t\_]:= {1/2, 0} とすると、定数曲線で、像は {(1/2, 0)} であり、円周  $x^2 + y^2 = 1$  を 1 点 (1/2, 0) に変形することになる。

以上は複素数を使っていないので、書き換えてみる。

```

Clear[phi0, phi1, F]
phi0[t_]:= Exp[I t];
phi1[t_]:= 3Cos[t]+2 I Sin[t];
F[t_, u_]:= (1-u)phi0[t]+u*phi1[t];
z2xy[z_]:= {Re[z], Im[z]}
Manipulate[ParametricPlot[{z2xy[phi0[t]], z2xy[phi1[t]], z2xy[F[t, u]]},
  {t, 0, 2 Pi}, PlotRange -> {{-3, 3}, {-3, 3}},
  {u, 0, 1}]

```

## 参考文献

[1]