

# 複素関数・同演習 第6回

～複素関数の微分、正則性、Cauchy-Riemann 方程式～

かつらだ まさし  
桂田 祐史

2020年10月7日

- 1 本日の内容・連絡事項
- 2 複素関数の極限、連続性、正則性 (続き)
  - 微分、正則性
    - 定義
    - 例
    - 微分可能な関数の和・差・積・商
    - 多項式と有理関数の正則性
    - 合成関数の微分法と逆関数の微分法
  - Cauchy-Riemann の方程式
    - 微分可能性の必要十分条件
- 3 参考文献

# 本日の内容・連絡事項

## 本日の内容・連絡事項

- Zoom オフィスアワーを月曜 12:30–13:30, 水曜 16:00–17:00 に設けます。参加するための情報は「シラバスの補足」に書いておきました。

# 本日の内容・連絡事項

- Zoom オフィスアワーを月曜 12:30–13:30, 水曜 16:00–17:00 に設けます。参加するための情報は「シラバスの補足」に書いておきました。
- 講義ノート [1] の §2.4, 2.5 を解説する。  
§2.4 は「～と同様」ばかりで少しユルい話である (一度真剣に聴けばそれで済むだろう)。  
§2.5 の **Cauchy-Riemann 方程式**はいよいよ複素関数の本論に突入。目を覚まして聴いて下さい。§2.5 は少し長めの話になります。

# 本日の内容・連絡事項

- Zoom オフィスアワーを月曜 12:30–13:30, 水曜 16:00–17:00 に設けます。参加するための情報は「シラバスの補足」に書いておきました。
- 講義ノート [1] の §2.4, 2.5 を解説する。  
§2.4 は「～と同様」ばかりで少しユルい話である (一度真剣に聴けばそれで済むだろう)。  
§2.5 の **Cauchy-Riemann 方程式**はいよいよ複素関数の本論に突入。目を覚まして聴いて下さい。§2.5 は少し長めの話になります。
- 宿題 3 を出します (締め切りは 10 月 13 日 13:30)。「複素関数演習」のレポートを見て下さい。今回から翌週解説するので、原則提出の遅延は認めません。

# 本日の内容・連絡事項

- Zoom オフィスアワーを月曜 12:30–13:30, 水曜 16:00–17:00 に設けます。参加するための情報は「シラバスの補足」に書いておきました。
- 講義ノート [1] の §2.4, 2.5 を解説する。  
§2.4 は「～と同様」ばかりで少しユルい話である (一度真剣に聴けばそれで済むだろう)。  
§2.5 の **Cauchy-Riemann 方程式**はいよいよ**複素関数の本論に突入**。目を覚まして聴いて下さい。§2.5 は少し長めの話になります。
- 宿題 3 を出します (締め切りは 10 月 13 日 13:30)。「複素関数演習」のレポートを見て下さい。**今回から翌週解説するので、原則提出の遅延は認めません。**
- 「複素関数」の授業内容・資料は「学生・教職員」に公開するようにしました。

### 定義 6.1 (微分可能, 正則)

簡単のため、 $\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合とし、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c \in \Omega$  とする。 $f$  が  $c$  で**微分可能** (differentiable) であるとは、極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

が存在することをいう。このときこの極限を  $f'(c)$  と表し、 $f$  の  $c$  における**微分係数** (the derivative of  $f$  at  $c$ ) と呼ぶ。



## 2.4 微分、正則性 2.4.1 定義

### 定義 6.1 (微分可能, 正則)

簡単のため、 $\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合とし、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c \in \Omega$  とする。 $f$  が  $c$  で**微分可能** (differentiable) であるとは、極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

が存在することをいう。このときこの極限を  $f'(c)$  と表し、 $f$  の  $c$  における**微分係数** (the derivative of  $f$  at  $c$ ) と呼ぶ。**導関数** (derivative, derived function) などの言葉の使い方は、実関数のときと同様に定義する。

## 2.4 微分、正則性 2.4.1 定義

### 定義 6.1 (微分可能, 正則)

簡単のため、 $\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合とし、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c \in \Omega$  とする。 $f$  が  $c$  で**微分可能** (differentiable) であるとは、極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

が存在することをいう。このときこの極限を  $f'(c)$  と表し、 $f$  の  $c$  における**微分係数** (the derivative of  $f$  at  $c$ ) と呼ぶ。**導関数** (derivative, derived function) などの言葉の使い方は、実関数のときと同様に定義する。

$\Omega$  の任意の点  $z$  に対して、 $f$  が  $z$  で微分可能であるとき、 $f$  は  $\Omega$  で**正則** (regular, 整型, holomorphic) であるという。

## 2.4.2 例

### 例 6.2 (正則な関数の例)

$f(z) = \gamma$  (定数関数) と  $g(z) = z$  は、 $\mathbb{C}$  全体で定義されて正則である。

## 2.4.2 例

### 例 6.2 (正則な関数の例)

$f(z) = \gamma$  (定数関数) と  $g(z) = z$  は、 $\mathbb{C}$  全体で定義されて正則である。

実際、任意の  $z \in \mathbb{C}$  に対して

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma - \gamma}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

であるから、 $f$  は  $z$  で微分可能で  $f'(z) = 0$ 。  $f$  は  $\mathbb{C}$  全体で正則である。

## 2.4.2 例

### 例 6.2 (正則な関数の例)

$f(z) = \gamma$  (定数関数) と  $g(z) = z$  は、 $\mathbb{C}$  全体で定義されて正則である。

実際、任意の  $z \in \mathbb{C}$  に対して

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma - \gamma}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

であるから、 $f$  は  $z$  で微分可能で  $f'(z) = 0$ 。  $f$  は  $\mathbb{C}$  全体で正則である。

また

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(z+h) - g(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z+h-z}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

であるから、 $g$  は  $z$  で微分可能で  $g'(z) = 1$ 。  $g$  は  $\mathbb{C}$  全体で正則である。

## 2.4.3 微分可能な関数の和・差・積・商

### 命題 6.3 (微分可能な関数の和・差・積・商)

$\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合、 $c \in \Omega$  とする。 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  と  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  が  $c$  で微分可能ならば、 $f + g$ ,  $f - g$ ,  $fg$ ,  $\frac{f}{g}$  (ただし  $g(c) \neq 0$  とする) も  $c$  で微分可能であり、

$$(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c),$$

$$(f - g)'(c) = f'(c) - g'(c),$$

$$(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{g(c)f'(c) - g'(c)f(c)}{g(c)^2}.$$

## 2.4.3 微分可能な関数の和・差・積・商

### 命題 6.3 (微分可能な関数の和・差・積・商)

$\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合、 $c \in \Omega$  とする。 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  と  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  が  $c$  で微分可能ならば、 $f + g$ ,  $f - g$ ,  $fg$ ,  $\frac{f}{g}$  (ただし  $g(c) \neq 0$  とする) も  $c$  で微分可能であり、

$$(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c),$$

$$(f - g)'(c) = f'(c) - g'(c),$$

$$(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{g(c)f'(c) - g'(c)f(c)}{g(c)^2}.$$

証明.

実関数の場合と同様である。 □

## 2.4.4 多項式と有理関数の正則性

### 系 6.4 (多項式と有理関数の正則性)

- ① 任意の自然数  $k$  に対して、 $f(z) = z^k$  は  $\mathbb{C}$  で正則で、 $f'(z) = kz^{k-1}$ .



## 2.4.4 多項式と有理関数の正則性

### 系 6.4 (多項式と有理関数の正則性)

- ① 任意の自然数  $k$  に対して、 $f(z) = z^k$  は  $\mathbb{C}$  で正則で、 $f'(z) = kz^{k-1}$ .
- ② 任意の複素係数多項式の定める関数は  $\mathbb{C}$  上で正則である。

$$\left( \sum_{k=0}^n a_k z^k \right)' = \sum_{k=1}^n k a_k z^{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) a_{j+1} z^j.$$

(2つめの等式がすらすら導けるように。「 $k-1=j$ とおくと…」)

## 2.4.4 多項式と有理関数の正則性

### 系 6.4 (多項式と有理関数の正則性)

- ① 任意の自然数  $k$  に対して、 $f(z) = z^k$  は  $\mathbb{C}$  で正則で、 $f'(z) = kz^{k-1}$ .
- ② 任意の複素係数多項式の定める関数は  $\mathbb{C}$  上で正則である。

$$\left( \sum_{k=0}^n a_k z^k \right)' = \sum_{k=1}^n k a_k z^{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) a_{j+1} z^j.$$

(2つめの等式がすらすら導けるように。「 $k-1=j$ とおくと…」)

- ③ 任意の複素係数有理式  $r(z) = \frac{q(z)}{p(z)}$  ( $p(z), q(z) \in \mathbb{C}[z]$ ,  $p(z)$  は零多項式ではない) の定める関数  $r: \Omega := \{z \in \mathbb{C} \mid p(z) \neq 0\} \ni z \mapsto r(z) \in \mathbb{C}$  は正則である。

## 2.4.5 合成関数の微分法と逆関数の微分法

## 2.4.5 合成関数の微分法と逆関数の微分法

**合成関数の微分法**  $f$  と  $g$  が合成可能で、 $f$  が  $c$  で、 $g$  が  $f(c)$  で微分可能ならば、 $g \circ f$  は  $c$  で微分可能で

$$(1) \quad (g \circ f)' = g'(f(c))f'(c).$$

あるいは  $w = f(z)$ ,  $\zeta = g(w)$  とするとき、合成関数  $\zeta = g(f(z))$  について

$$(2) \quad \frac{d\zeta}{dz} = \frac{d\zeta}{dw} \frac{dw}{dz}.$$

## 2.4.5 合成関数の微分法と逆関数の微分法

**合成関数の微分法**  $f$  と  $g$  が合成可能で、 $f$  が  $c$  で、 $g$  が  $f(c)$  で微分可能ならば、 $g \circ f$  は  $c$  で微分可能で

$$(1) \quad (g \circ f)' = g'(f(c))f'(c).$$

あるいは  $w = f(z)$ ,  $\zeta = g(w)$  とするとき、合成関数  $\zeta = g(f(z))$  について

$$(2) \quad \frac{d\zeta}{dz} = \frac{d\zeta}{dw} \frac{dw}{dz}.$$

### 逆関数の微分法

$$(3) \quad \frac{dz}{dw} = \frac{1}{\frac{dw}{dz}} \quad (\text{ただし } dw/dz \neq 0 \text{ とする})$$

も成り立つ (逆関数定理が重要だが、それは §2.5.5 で説明する)。

## 2.5 Cauchy-Riemann の方程式 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

## 2.5 Cauchy-Riemann の方程式 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

定理 6.5 (複素関数が微分可能  $\Leftrightarrow$  実部・虚部が微分可能かつ Cauchy-Riemann 方程式)

$\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c = a + bi \in \Omega$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) とする。 $f$  が  $c$  で微分可能であるためには、 $f$  の実部  $u$  と虚部  $v$  が  $(a, b)$  で (全) 微分可能でかつ

$$(\star) \quad u_x(a, b) = v_y(a, b), \quad u_y(a, b) = -v_x(a, b)$$

を満たすことが必要十分である。

### 定理 6.5 (複素関数が微分可能 $\Leftrightarrow$ 実部・虚部が微分可能かつ Cauchy-Riemann 方程式)

$\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c = a + bi \in \Omega$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) とする。 $f$  が  $c$  で微分可能であるためには、 $f$  の実部  $u$  と虚部  $v$  が  $(a, b)$  で (全) 微分可能でかつ

$$(\star) \quad u_x(a, b) = v_y(a, b), \quad u_y(a, b) = -v_x(a, b)$$

を満たすことが必要十分である。

( $\star$ ) を **Cauchy-Riemann の方程式** (the Cauchy-Riemann equations, the Cauchy-Riemann relations) と呼ぶ。



## 2.5 Cauchy-Riemann の方程式 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

**定理 6.5** (複素関数が微分可能  $\Leftrightarrow$  実部・虚部が微分可能かつ Cauchy-Riemann 方程式)

$\Omega$  は  $\mathbb{C}$  の開集合、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $c = a + bi \in \Omega$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) とする。 $f$  が  $c$  で微分可能であるためには、 $f$  の実部  $u$  と虚部  $v$  が  $(a, b)$  で (全) 微分可能でかつ

$$(\star) \quad u_x(a, b) = v_y(a, b), \quad u_y(a, b) = -v_x(a, b)$$

を満たすことが必要十分である。

( $\star$ ) を **Cauchy-Riemann の方程式** (the Cauchy-Riemann equations, the Cauchy-Riemann relations) と呼ぶ。

(復習)  $f$  の実部  $u$ , 虚部  $v$  は、 $u: \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $v: \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$u(x, y) := \operatorname{Re} f(x + yi), \quad v(x, y) := \operatorname{Im} f(x + yi) \quad ((x, y) \in \tilde{\Omega})$$

で定義される関数である。ただし

$$\tilde{\Omega} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + yi \in \Omega\}.$$

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.6 (正則関数が Cauchy-Riemann 方程式を満たすことを見る)

正則な  $f(z) = z^2$  ( $z \in \mathbb{C}$ ),  $f(z) = \frac{1}{z}$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = e^z$  などが、Cauchy-Riemann 方程式を満たすこと確かめてみよう。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

$f(z) = |z|$  の場合に証明してみよう。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

$f(z) = |z|$  の場合に証明してみよう。

実部  $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 虚部  $v(x, y) = 0$  である。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

$f(z) = |z|$  の場合に証明してみよう。

実部  $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 虚部  $v(x, y) = 0$  である。

- ①  $(x, y) \neq (0, 0)$  のとき、 $u_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $u_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $v_x = 0$ ,  $v_y = 0$  である。  
 $x \neq 0$  のとき  $u_x \neq 0 = v_y$ ,  $y \neq 0$  のとき  $u_y \neq 0 = -v_x$ . ゆえに任意の点で Cauchy-Riemann 方程式は成り立たない。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

$f(z) = |z|$  の場合に証明してみよう。

実部  $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 虚部  $v(x, y) = 0$  である。

- Ⓐ  $(x, y) \neq (0, 0)$  のとき、 $u_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $u_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $v_x = 0$ ,  $v_y = 0$  である。  
 $x \neq 0$  のとき  $u_x \neq 0 = v_y$ ,  $y \neq 0$  のとき  $u_y \neq 0 = -v_x$ . ゆえに任意の点で Cauchy-Riemann 方程式は成り立たない。
- Ⓑ  $(x, y) = (0, 0)$  のとき、 $u$  は偏微分可能でないので、(全)微分可能でもない。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 例

### 例 6.7 (微分可能でないことの証明に使ってみる)

$f(z) = \operatorname{Re} z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im} z$ ,  $f(z) = |z|$ ,  $f(z) = \operatorname{Arg} z$  ( $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ),  $f(z) = \bar{z}$  といったところ微分可能でない。これらは微分可能性の定義に戻って証明することも出来るが、上の定理を用いるのも簡単である。

$f(z) = |z|$  の場合に証明してみよう。

実部  $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 虚部  $v(x, y) = 0$  である。

- Ⓐ  $(x, y) \neq (0, 0)$  のとき、 $u_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $u_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $v_x = 0$ ,  $v_y = 0$  である。  
 $x \neq 0$  のとき  $u_x \neq 0 = v_y$ ,  $y \neq 0$  のとき  $u_y \neq 0 = -v_x$ . ゆえに任意の点で Cauchy-Riemann 方程式は成り立たない。
- Ⓑ  $(x, y) = (0, 0)$  のとき、 $u$  は偏微分可能でないので、(全)微分可能でもない。

(a), (b) より、任意の点  $(x, y)$  において、「 $u$  と  $v$  は (全) 微分可能で、Cauchy-Riemann 方程式が成り立つ」という条件は満たさない。ゆえに  $f$  は微分可能でない。 □



## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 Cauchy-Riemann 方程式の導出

定理 6.5 の証明前に、微分可能性から Cauchy-Riemann 方程式を導く **簡潔な方法**を紹介する。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

## Cauchy-Riemann 方程式の導出

定理 6.5 の証明前に、微分可能性から Cauchy-Riemann 方程式を導く簡潔な方法を紹介する。

$f$  が  $c = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) で微分可能ならば、 $u$  と  $v$  は  $(a, b)$  で偏微分可能で、

$$(\#) \quad f'(c) = u_x(a, b) + iv_x(a, b) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b))$$

が成り立つ。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

## Cauchy-Riemann 方程式の導出

定理 6.5 の証明前に、微分可能性から Cauchy-Riemann 方程式を導く簡潔な方法を紹介する。

$f$  が  $c = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) で微分可能ならば、 $u$  と  $v$  は  $(a, b)$  で偏微分可能で、

$$(\#) \quad f'(c) = u_x(a, b) + iv_x(a, b) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b))$$

が成り立つ。特に実部・虚部を比較して  $u_x(a, b) = v_y(a, b)$ ,  $u_y(a, b) = -v_x(a, b)$ .

定理 6.5 の証明前に、微分可能性から Cauchy-Riemann 方程式を導く簡潔な方法を紹介する。

$f$  が  $c = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) で微分可能ならば、 $u$  と  $v$  は  $(a, b)$  で偏微分可能で、

$$(\#) \quad f'(c) = u_x(a, b) + iv_x(a, b) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b))$$

が成り立つ。特に実部・虚部を比較して  $u_x(a, b) = v_y(a, b)$ ,  $u_y(a, b) = -v_x(a, b)$ 。  
((#) を  $f' = f_x = \frac{1}{i} f_y$  と書く人もいる。記号の濫用だが<sup>1</sup> 分かりやすいかも。)

証明

---

<sup>1</sup>うるさく言うと、 $f$  は変数  $z$  の複素関数であって、変数  $x, y$  の関数ではないので、 $f_x, f_y$  という書き方は変である。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件

定理 6.5 の証明前に、微分可能性から Cauchy-Riemann 方程式を導く簡潔な方法を紹介する。

$f$  が  $c = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) で微分可能ならば、 $u$  と  $v$  は  $(a, b)$  で偏微分可能で、

$$(\#) \quad f'(c) = u_x(a, b) + iv_x(a, b) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b))$$

が成り立つ。特に実部・虚部を比較して  $u_x(a, b) = v_y(a, b)$ ,  $u_y(a, b) = -v_x(a, b)$ . ((#) を  $f' = f_x = \frac{1}{i} f_y$  と書く人もいる。記号の濫用だが<sup>1</sup> 分かりやすいかも。)

**証明**  $f$  が  $c$  で微分可能とは、

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

が存在することであるが、 $h = h_x + ih_y$  ( $h_x, h_y \in \mathbb{R}$ ) の動く範囲を次の二通りに制限した場合を考える。

<sup>1</sup>うるさく言うと、 $f$  は変数  $z$  の複素関数であって、変数  $x, y$  の関数ではないので、 $f_x, f_y$  という書き方は変である。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 Cauchy-Riemann 方程式の導出 (続き)

- Ⓐ  $h_y = 0$  のとき (水平移動)、すなわち  $h = h_x$  ( $h_x \in \mathbb{R}$ ) (実数の値だけを取る)  
 $f(c + h_x) = u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)$  に注意すると、

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_x \in \mathbb{R}}} \frac{f(c + h_x) - f(c)}{h_x} = \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{(u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)) - (u(a, b) + iv(a, b))}{h_x} \\ &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \left( \frac{u(a + h_x, b) - u(a, b)}{h_x} + i \frac{v(a + h_x, b) - v(a, b)}{h_x} \right) = u_x(a, b) + iv_x(a, b). \end{aligned}$$

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 Cauchy-Riemann 方程式の導出 (続き)

- (a)  $h_y = 0$  のとき (水平移動)、すなわち  $h = h_x$  ( $h_x \in \mathbb{R}$ ) (実数の値だけを取る)  
 $f(c + h_x) = u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)$  に注意すると、

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_x \in \mathbb{R}}} \frac{f(c + h_x) - f(c)}{h_x} = \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{(u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)) - (u(a, b) + iv(a, b))}{h_x} \\ &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \left( \frac{u(a + h_x, b) - u(a, b)}{h_x} + i \frac{v(a + h_x, b) - v(a, b)}{h_x} \right) = u_x(a, b) + iv_x(a, b). \end{aligned}$$

- (b)  $h_x = 0$  のとき (垂直移動)、すなわち  $h = ih_y$  ( $h_y \in \mathbb{R}$ ) (純虚数の値だけを取る)  
 $f(c + ih_y) = u(a, b + h_y) + iv(a, b + h_y)$  に注意すると、

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\substack{h_y \rightarrow 0 \\ h_y \in \mathbb{R}}} \frac{f(c + ih_y) - f(c)}{ih_y} = \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{(u(a, b + h_y) + iv(a, b + h_y)) - (u(a, b) + iv(a, b))}{ih_y} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{h_y \rightarrow 0} \left( \frac{u(a, b + h_y) - u(a, b)}{h_y} + i \frac{v(a, b + h_y) - v(a, b)}{h_y} \right) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b)) \end{aligned}$$

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 Cauchy-Riemann 方程式の導出 (続き)

- Ⓐ  $h_y = 0$  のとき (水平移動)、すなわち  $h = h_x$  ( $h_x \in \mathbb{R}$ ) (実数の値だけを取る)  
 $f(c + h_x) = u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)$  に注意すると、

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_x \in \mathbb{R}}} \frac{f(c + h_x) - f(c)}{h_x} = \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{(u(a + h_x, b) + iv(a + h_x, b)) - (u(a, b) + iv(a, b))}{h_x} \\ &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \left( \frac{u(a + h_x, b) - u(a, b)}{h_x} + i \frac{v(a + h_x, b) - v(a, b)}{h_x} \right) = u_x(a, b) + iv_x(a, b). \end{aligned}$$

- Ⓑ  $h_x = 0$  のとき (垂直移動)、すなわち  $h = ih_y$  ( $h_y \in \mathbb{R}$ ) (純虚数の値だけを取る)  
 $f(c + ih_y) = u(a, b + h_y) + iv(a, b + h_y)$  に注意すると、

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\substack{h_y \rightarrow 0 \\ h_y \in \mathbb{R}}} \frac{f(c + ih_y) - f(c)}{ih_y} = \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{(u(a, b + h_y) + iv(a, b + h_y)) - (u(a, b) + iv(a, b))}{ih_y} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{h_y \rightarrow 0} \left( \frac{u(a, b + h_y) - u(a, b)}{h_y} + i \frac{v(a, b + h_y) - v(a, b)}{h_y} \right) = \frac{1}{i} (u_y(a, b) + iv_y(a, b)) \end{aligned}$$

以上から

$$f'(c) = u_x(a, b) + iv_x(a, b) = \frac{1}{i} [u_y(a, b) + iv_y(a, b)] = v_y(a, b) - iu_y(a, b).$$

実部・虚部を比較して、

$$u_x(a, b) = v_y(a, b), \quad v_x(a, b) = -iu_y(a, b).$$



## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 定理 6.5 の証明

### 定理 6.5 の証明

$f$  が  $c$  で微分可能であるとは

$$(\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(c+h) - f(c)}{h} - (p + iq) \right| = 0$$

が成り立つことを意味する。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 定理 6.5 の証明

### 定理 6.5 の証明

$f$  が  $c$  で微分可能であるとは

$$(\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(c+h) - f(c)}{h} - (p + iq) \right| = 0$$

が成り立つことを意味する。方針:  $u, v, p, q$  で表す。

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 定理 6.5 の証明

### 定理 6.5 の証明

$f$  が  $c$  で微分可能であるとは

$$(\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(c+h) - f(c)}{h} - (p + iq) \right| = 0$$

が成り立つことを意味する。方針:  $u, v, p, q$  で表す。

$h = h_x + ih_y$  ( $h_x, h_y \in \mathbb{R}$ ) とおくと

$$\begin{aligned} f(c+h) - f(c) &= u(a+h_x, b+h_y) - u(a, b) + i(v(a+h_x, b+h_y) - v(a, b)), \\ (p+iq)h &= (p+iq)(h_x + ih_y) = (ph_x - qh_y) + i(qh_x + ph_y) \end{aligned}$$

であるから

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 定理 6.5 の証明

### 定理 6.5 の証明

$f$  が  $c$  で微分可能であるとは

$$(\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(c+h) - f(c)}{h} - (p + iq) \right| = 0$$

が成り立つことを意味する。方針:  $u, v, p, q$  で表す。

$h = h_x + ih_y$  ( $h_x, h_y \in \mathbb{R}$ ) とおくと

$$\begin{aligned} f(c+h) - f(c) &= u(a+h_x, b+h_y) - u(a, b) + i(v(a+h_x, b+h_y) - v(a, b)), \\ (p+iq)h &= (p+iq)(h_x + ih_y) = (ph_x - qh_y) + i(qh_x + ph_y) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(c+h) - f(c)}{h} - (p+iq) \right| \\ &= \frac{|f(c+h) - f(c) - (p+iq)h|}{|h|} \\ &= \left| \frac{u(a+h_x, b+h_y) - u(a, b) - (ph_x - qh_y)}{\sqrt{h_x^2 + h_y^2}} + i \frac{v(a+h_x, b+h_y) - v(a, b) - (qh_x + ph_y)}{\sqrt{h_x^2 + h_y^2}} \right|. \end{aligned}$$

## 2.5.1 微分可能性の必要十分条件 定理 6.5 の証明

ゆえに

$f$  が  $c$  で微分可能

$$\Leftrightarrow (\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad \lim_{(h_x, h_y) \rightarrow (0,0)} \frac{u(a + h_x, b + h_y) - u(a, b) - (ph_x - qh_y)}{\sqrt{h_x^2 + h_y^2}} = 0$$

$$\text{かつ} \quad \lim_{(h_x, h_y) \rightarrow (0,0)} \frac{v(a + h_x, b + h_y) - v(a, b) - (qh_x + ph_y)}{\sqrt{h_x^2 + h_y^2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\exists p, q \in \mathbb{R}) \quad u \text{ と } v \text{ は } (a, b) \text{ で (全) 微分可能で}$$
$$u_x(a, b) = p, \quad u_y(a, b) = -q, \quad v_x(a, b) = q, \quad v_y(a, b) = p$$

$$\Leftrightarrow u \text{ と } v \text{ は } (a, b) \text{ で (全) 微分可能で } u_x(a, b) = v_y(a, b), \quad u_y(a, b) = -v_x(a, b). \quad \square$$

# 参考文献

- [1] 桂田祐史：複素関数論ノート，現象数理学科での講義科目「複素関数」の講義ノート. <http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/complex-function-2020/complex2020.pdf> (2014～).