

# Part I. 論理

桂田 祐史

katurada@meiji.ac.jp (@は ASCII の@), 910 号室

2013 年 4 月 16 日, 2022 年 9 月 8 日

多分授業では、数理リテラシーそのもののイントロを含めて、4 回くらいで済ませる。

(本当は、論理を軽くやってから、集合を説明し、それから論理に戻ってきてしっかり説明し直す、というのが適切な気がしている。つまり教科書 (中島 [1]) のやり方が良い。時間の節約のために、論理を強引に最初にまとめてしまったきらいがある。)

## 目次

<b>0</b>	<b>イントロ</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>命題論理</b>	<b>3</b>
1.1	命題とその真偽	3
1.2	否定	5
1.3	かつ (論理積)	6
1.4	または (論理和)	7
1.5	同値, 真理値表による証明	8
1.6	(おまけ) コンピューターで論理演算	10
1.7	同値変形による証明	11
1.8	ならば	13
1.9	misc	14
1.9.1	逆、対偶、裏	15
1.9.2	必要条件、十分条件、必要十分条件	15
<b>2</b>	<b>述語論理</b>	<b>15</b>
2.0	臨時講義: 数学で良く使う数の集合を表す記号	16
2.1	述語 (命題関数, 条件)	16
2.2	「任意の」, 「すべての」, $\forall$	16
2.3	「存在する」, 「ある」, $\exists$	19
2.4	複数の量称を含む命題 (工事中)	20
2.4.1	複数の変数を含む述語	20
2.4.2	複数の変数を含む述語の読み方	21
2.4.3	量称記号の順序	23
2.5	量称を含む命題の証明	25
2.6	量称と論理の法則、特に否定命題	27
<b>A</b>	<b>結合の優先順位</b>	<b>29</b>

B トートロジー	29
C ユークリッドの原論 — 証明の起源	30
D 基本的な用語・言葉遣い	30
D.1 議論の中での記号の定義	30
D.2 公理とは	31
E 授業の進行	32
F 解答	32

(少し直したいと思っているのだけど、時間が取れない…)

## この講義での約束ごと

集合や数列を表す以外の目的で  $\{ \}$  を使用しない。(普通の数学のテキストでは、その  $\{ \}$  が集合を表しているのか、数列を表しているのか、演算の結合順を指定するためのカッコを表しているのか、読者が文脈から判断することを要求しているが、この講義では、そういうことはしない。)

命題や条件をカンマ, で区切って並べることはしない。必ず「かつ」, “and”, “ $\wedge$ ” や、「または」, “or”, “ $\vee$ ” を書いて意味を明示する。(これも普通の数学のテキストでは、文脈から判断しなさい、という場合が少なくない。個人的には、それは悪い慣習だと考えている。ともあれ、この講義では数学の言葉として論理を学ぶので、なるべく省略や短縮化は抑えて書くという方針で記述する。)

数学のテキストでは、同じことを表すために色々な用語・記号が使われているのが普通である。どういう用語・記号が使われるか、ある程度まで紹介するが(色々なものが読めるようになるべきであるから)、以後はこの講義で選択した用語・記号を首尾一貫して用いる(相手に伝えるときは、用語・記号は統一する方が親切で、そうすべきである)。色々な文書を読んだり、話が聴けるようになるべきであるが、自分が書いたり話すときは、TPO で選んだやり方を首尾一貫して使うようにしよう。

## 0 イントロ

数理リテラシーの3つの大きな話題(論理、集合、写像)のうち、論理についての説明を始める(しかし例の中では集合を持ち出したりする…ちよつといいかげん)。

論理は数学の基礎と言えるが、論理をきちんと説明するのは案外難しい。大学の数学のテキストで論理を扱っているものは、実はあまり多くない<sup>1</sup>。論理については高等学校までの数学で身につけているものとして、集合から説明から始めているものが多い。数少ない論理を扱った本に初等的なものは少なく、内容も本ごとに大きく異なっている。

それでは高等学校の数学の教科書での論理の説明はしっかりしているかという、そうは言いにくいところがある。ド・モルガンの法則はあっても論理の分配律はないなど、不思議な感じの内容である(率直に言って「一体どう考えているんだろう」と思う)。

この講義で採用した教科書(中島 [1])は、論理について説明してある点で貴重であると思う。この本の最初の部分では、日常語の論理と数学での論理の違いの説明にページを割いている。

<sup>1</sup>と書いたけれど、最近少しずつ増えてきているような気がする。コンピューター・サイエンス(情報科学)の影響があるような気がする。気のせいかもしれないけれど。

それは意味のあることだし、興味深く感じられる人もいるようだが、授業でこなすのは、かなり時間が必要になるし、以後の必要な数学を展開するのに必須とは思えない。そこでこの講義では、以下のようにする。

まず数学で用いる論理を記号、式で表すことを目標とする。式で表すことで論理の法則が明確になる。それを確認することで先に進み、最後に(時間が残っていれば)反省することにしよう(どちらかという、教科書とは逆順に話を進める…最近では時間に余裕がなくて、反省はサボりがちになっている)。

教科書以外の読みやすい参考書を二三あげておく(どれもとてもお勧め)。中内 [2] 練習問題が多く、学習に便利だと思われる。新井 [3] は論理学の専門家による、初学者向けの分かりやすい真面目な入門書である。少しずれるが、数学的な文章を分かりやすく書くにはどうすれば良いか論じた結城 [4] をあげておく。

実を言うと、講義をする立場としては、上に紹介した教科書や参考書の説明では、私自身がすっきりしないところがある。もう少し専門的な内容の本を何冊かめくってみて(例えば島内 [5], 前原 [6])、自分なりにすっきりした説明が出来ないか検討したが、今のところ解答が見つかっていない。

## 1 命題論理

命題と条件に関する論理演算  $\neg$  (～でない),  $\wedge$  (かつ),  $\vee$  (または),  $\Rightarrow$  (ならば) は、真理値を定めるルールによって特徴づけられる。見方によっては意味を考えずに (?) 定義出来る<sup>2</sup>。

この節では、複数の命題が組み合わされた複合命題の真偽を問う命題論理を扱う(変数を含む「条件(述語)」については、次節「述語論理」で扱う)。

### 1.1 命題とその真偽

(以下、用語の説明をするが、数学的な定義というわけではない。)

正しいか正しくないか、数学的に判断できる主張(文章や式)のことを<sup>めいだい</sup>命題(proposition)と呼ぶ。

(注意: 正しい、正しくないとは、道徳的・倫理的・法律的な善悪を言っているのではない。真理・事実に合致するか、ということである。)

**例 1.1** 「 $1 + 1 = 2$ 」は命題である。「円周率は有理数である」、「 $\sin 1$  は 1 より大きい」は命題である。「1 億は大きい」は命題でない。 ■

命題のことを  $p, q, \dots, p_1, p_2, \dots$  のような文字や記号で表す。

ある命題が正しいことを「その命題は<sup>しん</sup>真である (true)」、「その命題は成り立つ」、「その命題が成立する」、「その命題の<sup>しんりち</sup>真理値 (truth value) は T である」といい、命題が正しくないことを「その命題は<sup>ぎ</sup>偽である (false [fɔ:ls], 「フォールス」)」、「その命題は成り立たない」、「その命題は成立しない」、「その命題の真理値は F である」という。つまり、ある命題の真理値とは、その命題が真であるか、偽であるかを T, F という記号で表したものである。T の代わりに 1, F の代わりに 0 と書く流儀もある(実は 2 進数のコンピューターでの論理演算に対応する)。

<sup>2</sup>いわゆる数の演算でも同様のことをしている。加える、引く、かける、割る、という量に関する演算が数の世界で形式的に定義されているわけだ。

## 例 1.2 以下の4つの命題

$$p_1 \quad 1 + 1 = 2$$

$p_2$  円周率は有理数である。

$p_3 \quad e > 2.7$  (ただし  $e$  は自然対数の底)

$$p_4 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

の真理値は順に T, F, T, T. ■

命題が真であることを論理的に示すことを命題を**証明する** (prove) という (あるいはその操作を**証明** (proof) と呼ぶ)。証明された命題のことを**定理** (theorem) と呼ぶ。

### 脱線: 証明の起源

数学の議論は定理をつないで行く作業である。命題が真であることを示すためには証明が必要である。証明は古代ギリシャで発明された。一気にすごい (完成度の高い) ものが出来た。

アレクサンドリアのエウクレイデス (ユークリッド) により、その時期までの数学の集大成が「原論 (ストケイア)」という著作 [7] にまとめられた (B.C. 3C 頃, 全 13 巻)。公理 5 (or 9), 公準 (5) から始めて 465 の命題が証明されている。それらの命題は、現在でもすべて正しい (証明には文句があつたりするけれど) と考えられている。

### 定理、補題、命題、系

数学のテキストや講義で、“正しい命題” という意味での定理を、定理 (theorem), <sup>ほだい</sup>補題 (補助定理, lemma), 命題 (proposition), <sup>けい</sup>系 (corollary) のように区別して呼ぶことがある。これは次のように使い分けられている。

- 全部定理にすると、数が多くなって、重要さの区別がつきにくいので、特に重要なものだけを「定理」と呼ぶ。
- 定理を証明する目的で用意される“小さめの定理”を「補題」と呼ぶ。
- 定理などからすぐに導かれる“小さめの定理”を「系」と呼ぶ。
- その他の“小さめの定理”を「命題」と呼ぶ。

注: 真な命題であるという意味では定理であるが、重要性がそれほどでもないので「命題」と呼ぶ、というやり方はもしかすると古めかしいかもしれない。

**余談 1.3** もう少し“文法”の説明をすべきかもしれない (採用している教科書がその辺を省略しているので…)。 $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$  を**論理記号**といい、命題を表す“変数”に相当する  $p, q, \dots, p_1, p_2, \dots$  などを**命題変項**という。つねに T の真理値を持つ命題を表す記号  $\top$  とつねに F の真理値を持つ命題を表す記号  $\perp$  を導入し ( $\top, \perp$  の代わりに  $\Upsilon, \perp$  を使う本もある。どういう字を採用するかは複数の流儀があるようだ。)、**命題定項**という<sup>3</sup>。論理記号、命題変項、命題定項が語彙で、それらを適当なルールで組み合わせたものを**論理式**と呼ぶ。

$\top, \perp, \Upsilon, \perp$  は、 $\text{\TeX}$  ではそれぞれ  $\backslash\text{top}, \backslash\text{bot}, \backslash\text{curlyvee}, \backslash\text{curlywedge}$  と入力する。■

<sup>3</sup>教科書では導入していないのだけど、ちょっとやりにくくて困っている。

## 1.2 否定

命題  $p$  について、「 $p$  でない」という命題を、 $p$  の**否定** (negation) と呼び、 $\neg p$  で表す。読むときは「 $p$  でない」または「not  $p$ 」という。

例えば「 $1+1=2$ 」を  $p$  とするとき、 $\neg p$  は「 $1+1 \neq 2$ 」である。また「 $\sqrt{10} > \pi$ 」を  $p$  とするとき、 $\neg p$  は「 $\sqrt{10} \leq \pi$ 」である。(これはここに書くことではないような気もするが、集合の包含関係  $A \subset B$  の否定は  $A \supset B$  ではなく、 $A \not\subset B$  である。)

$p$  の否定を表すのに、 $\bar{p}$  や  $\sim p$  など、 $\neg p$  以外の記号を用いることも多い。この講義では首尾一貫して  $\neg p$  と表す。

(豆知識)  $\neg p$  は TeX では、`\neg p` あるいは `\lnot p` と入力する。

次の2つのことを仮定する (認めて議論する)。

はいちゅうりつ

**排中律** (the principle of excluded middle)

任意の命題  $p$  について、 $p$  または  $\neg p$  のどちらかが成り立つ。

むむじゅんりつ

**無矛盾律** (the law of noncontradiction)

任意の命題  $p$  について、 $p$  と  $\neg p$  が同時に成り立つことはない。

むじゅん

**矛盾** (contradiction) とは、ある命題  $p$  とその否定命題「 $p$  でない」が同時に真であることをいう。つまり無矛盾律とは、矛盾が存在しない、ということである。

**余談 1.4** 以前の講義ノートでは、無矛盾律のことを矛盾律と呼んでいたが、排中律という言葉と並べるとおかしな感じがした。矛盾がないという意味なのだから、「排矛盾律」とか、矛盾を否定するような表現にすべきではないか。「無矛盾性」という言葉は知っていたので、「無矛盾律」という言葉はあるのかな? と思ったら、ちゃんとそういう言葉があることが分かった。というわけで「無矛盾律」を使うことにした。■

何か1つの命題  $p$  について、 $p$  と  $\neg p$  が同時に成り立てば、任意の命題  $p'$  について、 $p'$  と  $\neg p'$  が同時に真であることが証明出来る。もしそうなったらムチャクチャであり<sup>4</sup>、まともな議論は一切出来ない。だから無矛盾律は絶対に必要であると考えられている。

$1+1=2$  や  $\pi > 4$  のような命題  $p$  については (真偽がすぐ分かるので)、 $p$  か  $\neg p$  のどちらかが成り立つことは自明だが、真偽が容易に判定できないような命題についてもどちらかが成り立つことを仮定するのが排中律である。このことに不賛成な数学者もいて、**直観主義論理** といふのを考案したが (有名なのは Brouwer<sup>5</sup>)、以下では排中律を仮定して議論を行う。

### 背理法

命題  $p$  が真であることを証明するために、 $p$  が成り立たない、つまり  $\neg p$  が成り立つと仮定して、矛盾が導かれることを示す、という方法がある。これを**背理法**(proof by contradiction — 直訳すると「矛盾による証明」) という。

(排中律により、 $p$  か  $\neg p$  のいずれかが成り立つ。 $\neg p$  が成り立つと仮定すると矛盾が生じるならば、無矛盾律より  $\neg p$  は成り立たないことが導かれる。ゆえに  $p$  が成り立つ。)

<sup>4</sup>例えば、 $1+1 \neq 2$  も  $1+1=3$  も真であることになる。

<sup>5</sup>Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881年~1966年) は、直観主義数学の創始者としても有名だが、**Brouwerの不動点定理**などのトポロジーの分野でも多大な業績を残した。

## 真理値表

任意の命題  $p$  について、 $\neg p$  の真理値は、 $p$  の真理値が T であれば F,  $p$  の真理値が F であれば T である。このことを表 1 のような表形式で表したものを**真理値表** (truth table, 真偽表) と呼ぶ。

$p$	$\neg p$
T	F
F	T

表 1:  $p$  とその否定  $\neg p$  の真理値表

(念のため) 行ごとに読むわけである ( $p$  が T のとき  $\neg p$  は F,  $p$  が F のとき  $\neg p$  は T である)。

### 1.3 かつ (論理積)

2つの命題  $p$  と  $q$  に対して、「 $p$  であり、かつ  $q$  である」という命題を  $p \wedge q$  と表し、「 $p$  かつ  $q$ 」、「 $p$  and  $q$ 」と読む。

$p$  と  $q$  の**論理積** (logical conjunction)、**連言** (conjunction) <sup>れんげん</sup> と言う (これらの言葉はあまり使わないので、覚えなくても良いかもしれない)。

「そして」、「しかし」は良く出て来るが、どちらも「かつ」と同じである (日常語としては、それぞれ、順接、逆接で、ニュアンスは異なるが、2つの事実が同時に成立しているという意味では同じである)。

$p \wedge q$  の真理値は、 $p$  と  $q$  の真理値がともに T であるときに T で、そうでないときは F である。

$p$  と  $q$  はそれぞれが T, F という2つの真理値を取るので、その組  $(p, q)$  の真理値は4つの場合がある。そこで  $p \wedge q$  の真理値は、表 2 のような真理値表で表せる。

$p$	$q$	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

表 2:  $p, q$  とその論理積  $p \wedge q$  の真理値表

**注意 1.5 (順番について)** 4つの場合をどのように並べるかについては、「辞書式順序」を用いることを強く勧める (樹形図を使って素直に書くとそうなるはず)。

Tの方がFより先、とすると、上の表の順番になる。Fの方がTより先、とすると

$p$	$q$	$p \wedge q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

となる。 ■

(豆知識) TeX では、 $p \wedge q$  あるいは  $p \land q$  と入力する。

## 1.4 または (論理和)

2つの命題  $p$  と  $q$  に対して、「 $p$  であるか、または  $q$  である」という命題を  $p \vee q$  と表し、「 $p$  または  $q$ 」、「 $p$  or  $q$ 」と読む。

$p$  と  $q$  の**論理和** (logical disjunction)、**選言**(disjunction) <sup>せんげん</sup> と言う (これらの言葉も覚えなくても良いかも)。

$p \vee q$  の真理値は、次の表 3 のように定める。

$p$	$q$	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

表 3:  $p, q$  とその論理和  $p \vee q$  の真理値表

2, 3, 4 行目は抵抗がないと思うが、1 行目、つまり  $p$  が T,  $q$  が T であるとき、 $p \vee q$  は T というのは、抵抗を感じる人がいるかもしれない。日常用語で「または」というのは、**どちらか一方だけが**、という意味 (**排他的論理和** <sup>はいたてきるんりわ</sup> (exclusive or) という) に使う場合もあるからである。数学で「または」というのは、**少なくとも一方が**、という意味で使う約束である (そうする理由は、そうした方が記述がシンプルになる場合が多いからである<sup>6)</sup>)。

繰り返しになるが、 $p$  と  $q$  がともに T であるとき  $p \vee q$  は T というのは、数学的事実を主張しているというよりも、そういうように  $\vee$  という論理演算を定義している (言葉の約束である)。

(豆知識) TeX では、 $p \vee\vee q$  あるいは  $p \vee\lor q$  と入力する。

## ここまでのまとめと注意

ここまで、命題の真理値 T, F と、命題に関する 3つの演算  $\neg, \wedge, \vee$  を導入した。

以下、これらの演算を組み合わせた複雑な式が登場する。

普通の数に対する演算  $\times, +$  については、「(カッコで指定していないならば)  $\times$  を先に計算する」という約束をするが、 $\wedge, \vee$  については特にそのような約束をしないのが普通である。そのため、どちらを先に計算するかを指示するため、括弧を多用することになる。つまり数では、 $p$  と  $q \times r$  の和を  $p + q \times r$  と書けるが、論理では、 $p$  と  $q \wedge r$  の論理和は  $p \vee (q \wedge r)$  のように書かねばならない。(括弧を省略して  $p \vee q \wedge r$  と書くと、 $(p \vee q) \wedge r$  と区別が出来ない — なお、実際に両者が異なることは、後述の例 1.10 で確認する)。これは後で学ぶ集合の  $\cap, \cup$  についても同様で、 $A \cup (B \cap C)$  のように括弧を付けるのが普通である。

なお、 $\neg$  は  $\wedge$  や  $\vee$  より優先的に結合する、と約束するのが普通である。例えば、 $(\neg p) \vee q$  は  $\neg p \vee q$  と書いて構わない。また、 $(\neg p) \vee (\neg q)$  は  $\neg p \vee \neg q$  と書いて構わない。

なお、付録の A 「結合の優先順位」も参照することを勧める。

<sup>6</sup>例えば、良く出て来る「 $ab = 0$  は、 $a = 0$  または  $b = 0$  と同値」という内容を、排他的論理和の「または」で表現するとどう表現すれば良いか? また、「 $abc = 0$  は、 $a = 0$  または  $b = c$  または  $c = 0$  と同値」についてはどうか?

## 1.5 同値, 真理値表による証明

2つの命題  $p$  と  $q$  に対して、(その具体的な内容に関わらず、その真理値のみに注目して)  $p$  と  $q$  の真理値が一致するとき、その2つの命題は<sup>どっち</sup>同値 (equivalent) であるといい、 $p \equiv q$  で表す。

例えば、 $1 + 1 = 2$  と  $\sin 1 < 1$  はどちらも真であるから

$$1 + 1 = 2 \quad \equiv \quad \sin 1 < 1.$$

$p$  を任意の命題とするとき

$p$	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
T	F	T
F	T	F

であるから、 $\neg(\neg p)$  (これは単に  $\neg\neg p$  とも書く) と  $p$  は同値である。つまり

$$(1) \quad \neg\neg p \equiv p \quad (\text{反射律}).$$

同様にして以下のことが証明できる。

(2) 任意の命題  $p$  について、 $p \wedge (\neg p)$  は常に偽である (**無矛盾律**)。任意の命題  $p$  について、 $p \vee (\neg p)$  は常に真である (**排中律**<sup>はいちゅうりつ</sup>, law of excluded middle)。

(以下「任意の命題」と書くのをさぼらしてもらおうが、そういう意味で書いてあることは忘れないで欲しい。)

$$(3) \quad p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p \quad (\text{交換律}).$$

$$(4) \quad p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r, p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r \quad (\text{結合律}).$$

$$(5) \quad p \vee (q \wedge p) \equiv (p \vee q) \wedge p \equiv p \quad (\text{吸収律}).$$

$$(6) \quad p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r), p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad (\text{分配律}).$$

$$(7) \quad p \vee p \equiv p, p \wedge p \equiv p \quad (\text{冪等律})<sup>べきとうりつ</sup>.$$

$$(8) \quad \neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q) \quad (\text{ド・モルガンの法則 (de Morgan の法則)}).$$

(豆知識) 結合律、交換律、吸収律が成り立つ代数系を<sup>そく</sup>束 (lattice) と呼ぶ。さらに**ブール束**と呼ばれる代数系もある (詳細は省略する)。その典型例になっている。

ここでは分配律の一つ、

$$(\spadesuit) \quad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

を証明しよう。これは次の真理値表から証明できる<sup>7</sup>。

<sup>7</sup>普通の数の演算規則の証明と異なり、場合の数が有限個しかないので、すべての場合について計算して確かめるという手段が有効である (その意味では普通の数の演算規則の証明よりも易しい)。



$p$	$q$	$r$	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

(書き方についての注意: 左 1,2,3 列に注目。  $2^3 = 8$  個もれなく書くためには、樹形図を念頭におくと良い。すでに説明した辞書式順序ということである。)

真理値表の 5 列目と 8 列目の真理値が一致するので、(♠) が成り立つ。 ■

**問 1.**

(♡) 
$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

を証明せよ (解答は p. 32)。

**注意 1.6 (行と列)** 上の例で「5 列目」、「8 列目」と書いたが、宿題などで「5 行目」、「8 行目」と書く人がいる。横書きの場合は、「行 (row)」は横にのびているもので、縦にのびているのは「列 (column)」というのが普通である (Cf. 線形代数の行列の行と列)。 ■

**問 2.** ド・モルガンの法則を真理値表を使って証明せよ。

ド・モルガンの法則は、集合の演算に関する法則として高校で学んだ人が多いかも知れない。

—— 集合に関するド・モルガンの法則 (高校流の表し方) ——

集合の補集合を上記 — をつけて表すことにすると、

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

これを  $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$ ,  $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$  と見比べてみよう。

**例 1.7**  $p, q$  をそれぞれ「金の斧がもらえる」、「銀の斧がもらえる」という命題とする。

「金の斧がもらえる」かつ「銀の斧がもらえる」(両方ももらえる)

の否定は

「金の斧がもらえない」または「銀の斧がもらえない」(少なくとも一方はもらえない)

である。

一方

「金の斧がもらえる」または「銀の斧がもらえる」(少なくとも片方はもらえる)

の否定は

「金の斧がもらえない」かつ「銀の斧がもらえない」(どちらももらえない)

である。 ■

「または」を「どちらか一方だけが成立するときに真」(排他的論理)でなく、「少なくとも一方が成立するときに真」と定義したことで、上のようなきれいな形の式になることに注意する。

**余談 1.8** 論理の説明をする際に、上のように日常語による例を使う場合があるが、本当は、こういうのは命題もどきで、その真偽を数学的に判定できるようなものではない。「金の斧」がなんであるか、「もらえる」とはどういうことか、考え始めると、曖昧なことが分かる。■

**余談 1.9 (トートロジー)** 命題変項を含む論理式が、すべての命題変項の可能な真理値に対して、常に真となるとき、その論理式を**トートロジー** (恒真式, tautology) と呼ぶ。例えば  $p \vee (\neg p)$  はトートロジーである。■

**問 3.**  $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$  はトートロジーであることを示せ。

**例 1.10 (念のため)**  $p \vee (q \wedge r)$  と  $(p \vee q) \wedge r$  は同値でないことを確かめよう。

$p$	$q$	$r$	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	F
T	F	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

確かに第5列と第7列の真理値は違っている。■

## 1.6 (おまけ) コンピューターで論理演算

(ここはおそらく授業ではカットすることになる。)

コンピューターのプログラミング言語の C では、整数型データに対して論理演算が出来る。少々変則的であるが、0 は F, 0 以外の整数は T として扱われる。

$\neg$  は !,  $\vee$  は ||,  $\wedge$  は && で計算できる (ビット演算子の |, & と混同しないように注意)。

———— logical.c ————

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int p,q;
    printf("p !p\n");
    for (p = 1; p >= 0; p--)
        printf("%d %d\n", p, !p);

    printf("p q p||q p&&q p->q\n");
    for (p = 1; p >= 0; p--)
        for (q = 1; q >= 0; q--)
            printf("%d %d %d %d %d\n", p, q, p||q, p&&q, !p||q);
    return 0;
}
```

```
$ cc logical.c
$ ./a.out
p !p
1 0
0 1
p q p||q p&&q p->q
1 1 1 1 1
1 0 1 0 0
0 1 1 0 1
0 0 0 0 1
$
```

結果を T, F で表すために軽くお化粧。

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int p,q;
    char TF[] = {'F','T'};
    printf("p !p\n");
    for (p = 1; p >= 0; p--)
        printf("%c %c\n", TF[p], TF[!p]);

    printf("p q p||q p&&q p->q\n");
    for (p = 1; p >= 0; p--)
        for (q = 1; q >= 0; q--)
            printf("%c %c %c %c %c\n",
                TF[p], TF[q], TF[p||q], TF[p&&q], TF[p->q]);
    return 0;
}
```

```
$ gcc logical2.c ; ./a.out
p !p
T F
F T
p q p||q p&&q p->q
T T T T T
T F T F F
F T T F T
F F F F T
$
```

## 1.7 同値変形による証明

真理値表による証明は、「必ず出来る」という意味では強力である。しかし、例えば

$$(\clubsuit) \quad (p \vee q) \wedge (r \vee s) \equiv (p \wedge r) \vee (p \wedge s) \vee (q \wedge r) \vee (q \wedge s)$$

を証明せよ、と言われると面倒である<sup>8</sup>。p, q, r, s と 4 つあるので、 $2^4 = 16$  行必要になる。期末試験でそれを実行した人がいるが、書くのも大変、読んでチェックする方も大変、間違えたときバツをつけるのは悲しい(16 行もあったら、どこかでミスをして仕方がないので、やり方が悪いと考えるべきだろう)。

<sup>8</sup>数の場合の  $(p+q)(r+s) = pr + ps + qr + qs$  に対応している。

数に関する式の証明 (計算) と同様に、既に述べた基本的なルールと、次の2つの定理を用いれば、式変形により証明が出来る。

与えられた論理式をそれと同値な論理式で置き換えることを**同値変形**という。同値変形を続けて得られる論理式はもとの論理式と同値である。

**定理 1.11** 任意の命題  $p, q, r$  に対して

$$p \equiv q \quad \text{かつ} \quad q \equiv r$$

ならば

$$p \equiv r.$$

(数に関する等式についての「 $p = q$  かつ  $q = r$  ならば  $p = r$ 」という定理の命題論理版である。)

**証明**  $p \equiv q$  は、 $p$  と  $q$  の真偽が一致することを意味する。言い換えると、

$p$  と  $q$  が両方とも真である、または  $p$  と  $q$  が両方とも偽である

ということを表す。

それと同時に  $q \equiv r$  が成り立つので、

3つの命題  $p, q, r$  がすべて真である、または3つの命題  $p, q, r$  がすべて偽である

が成り立つ。特に

$p$  と  $r$  が両方とも真である、または  $p$  と  $r$  が両方とも偽である

が成り立つ。ゆえに  $p \equiv r$ . ■

**定理 1.12** 任意の命題  $p, q, r$  に対して

$$p \equiv q$$

ならば、

(1)  $\neg p \equiv \neg q$

(2)  $p \wedge r \equiv q \wedge r$

(3)  $p \vee r \equiv q \vee r$

が成り立つ。

(数に関する等式ならば、等式の両辺に同じ数を足したり、かけたりしても、等式が得られる、という定理に相当する。その命題論理版である。「代入ができる」という見方もできる。)

**証明** (1) のみ証明する (他も同様に証明できる)。

$p \equiv q$  が成り立つことは (定義によって)

$p$  と  $q$  が両方とも真である、または  $p$  と  $q$  が両方とも偽である

ということである。

(i)  $p$  と  $q$  が両方とも真であるとき、 $\neg p$  と  $\neg q$  は両方とも偽である。

(ii)  $p$  と  $q$  が両方とも偽であるとき、 $\neg p$  と  $\neg q$  は両方とも真である。

いずれの場合も、 $\neg p$  と  $\neg q$  の真偽は一致する。ゆえに

$$\neg p \equiv \neg q. \blacksquare$$

**例 1.13**  $(p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$  を証明せよ。

分配律は既に証明したと記憶しているかもしれないが、§1.5 に載せたのは、

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

であり、同じでないことに注意する。

一方、§1.5 で、 $\wedge$  について交換律  $p \wedge q \equiv q \wedge p$  が成り立つことは述べてある。

この2つを組み合わせれば良い。

(証明)

$$\begin{aligned} (p \vee q) \wedge r &\equiv r \wedge (p \vee q) \\ &\equiv (r \wedge p) \vee (r \wedge q) \\ &\equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r) \end{aligned}$$

最初の  $\equiv$  で交換律 (と定理 1.12)、次の  $\equiv$  で結合律、次の  $\equiv$  で交換律 (と定理 1.12) を用いている。

ゆえに (定理 1.11 を用いて)

$$(p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r). \blacksquare$$

**問 4.** (1) ( $\clubsuit$ ) を証明せよ。(2) ( $\clubsuit$ ) で  $\wedge$  と  $\vee$  を入れ替えた式を証明せよ。

## 1.8 ならば

命題に関する新しい演算として「ならば ( $\Rightarrow$ )」を導入する。

2つの命題  $p$  と  $q$  に対して、「 $p$  ならば  $q$  である (If  $p$ , then  $q$ )」という命題を  $p \Rightarrow q$  と表す。その正確な意味は以下で定義する。

(本によっては、 $p \Rightarrow q$  のことを  $p \rightarrow q$  と書くものがある。さらに、 $p \rightarrow q$  の真理値が T であることを  $p \Rightarrow q$  と書いて区別して表すこともある。)

どのように定義するか。ここでは真理値表を用いて定義する (表 4)。

$p$	$q$	$p \Rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

表 4:  $p \Rightarrow q$  の真理値表

**例 1.14** 「 $1+1=2 \Rightarrow \sqrt{2}$ は無理数」は真である。「 $1+1=3 \Rightarrow \sqrt{2}$ は有理数」も真である。

■

普通は  $p$  が真のときのことしか考えない(そのとき  $q$  が真になるかどうか問題となる) ような気がするが、 $p$  が偽のときも、表を埋めておくのである。

理解した気分になるための解説?

$p \Rightarrow q$  が真であるためには、 $p$  が真であれば  $q$  が真であることが大事で、 $p$  が偽のときは  $q$  は真でも偽でもどちらでも良い(どちらでも  $p \Rightarrow q$  は真である)。一方、 $p$  が真であるのに、 $q$  が偽である場合は、 $p \Rightarrow q$  は偽である。

上の表の  $p \Rightarrow q$  の真理値は  $(\neg p) \vee q$  の真理値に一致する。そこで  $p \Rightarrow q$  とは、 $(\neg p) \vee q$  のことと定義することもある。(どちらでやっても良いはずだが、式で定義するのが扱いやすいためか、そうしてある本が多いような気がする。)

問 5.  $(\neg p) \vee q$  の真理値表を書け。

真理値表で定義するにしても、 $(\neg p) \vee q$  のこととして定義するにしても、

$$(2) \quad p \Rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$$

である。これはぜひとも覚えておこう。

「 $p$  ならば  $q$ 」の否定が、次のようにド・モルガンの法則を用いて計算できる<sup>9</sup>。

$$\begin{aligned} \neg(p \Rightarrow q) &\equiv \neg((\neg p) \vee q) \\ &\equiv (\neg\neg p) \wedge (\neg q) \\ &\equiv p \wedge (\neg q). \end{aligned}$$

ゆえに

$$(3) \quad \neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge (\neg q).$$

もちろん真理値表を用いて証明することも出来る。いずれにしろ、重要な定理である。

**余談 1.15 ( $p \wedge (\neg q)$  をどう読むか)**  $p \wedge (\neg q)$  を言葉で表すには、英語ならば例えば「 $p$  and not  $q$ 」とすれば良い。日本語の場合はどうすれば良いだろうか? 単に「 $p$  かつ  $q$  でない」と言うと、 $\neg(p \wedge q)$  のことを混同されてしまいそうである。「 $p$  かつ ( $q$  でない)」とカッコを使えば誤解の余地はなくなるが、カッコを使うのは苦し紛れ(そんな日本語じゃない)と言われそうである。逆接を用いて「 $p$  であるのに  $q$  でない」とするのだろうか。式で書いたものを簡潔な言葉で誤解なく伝えるのは簡単でないことがある。■

**注意 1.16** 後で出て来る“条件”(述語)に対してではなく、命題に対して  $\Rightarrow$  を用いることに違和感を持つ人が少なくないと想像する。まず「ならば」の前後に書いてあることは、何か共通のものに関係したことで、前者が原因、後者がその結果のように考えるのが普通であろう。上のように定義すると、「 $1+1=2$  ならば  $\sqrt{2}$  は無理数」は真な命題となるが、真偽は別にしても、異様な感じがするのではないか( $1+1=2$  であることと、 $\sqrt{2}$  が無理数であることに関係があるのだろうか?)。高等学校の数学でも、以前は命題に対して「ならば」を扱っていたが、現在の高等学校の「数学 I」では、「ならば」は条件の場合に限定しているようである(問題を回避している)。■

## 1.9 misc

(ここは高校生のときに学んでいるはずなので、授業ではスキップするかもしれない。)

<sup>9</sup>これは有名な問題で、これが出来れば数理リテラシーのレベル 1 クリアと言えるかも。

### 1.9.1 逆、対偶、裏

$q \Rightarrow p$  を、命題  $p \Rightarrow q$  の**逆** (reverse) と呼ぶ。

$(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$  を、命題  $p \Rightarrow q$  の**対偶** (contraposition) と呼ぶ。

$(\neg p) \Rightarrow (\neg q)$  を、命題  $p \Rightarrow q$  の**裏** と呼ぶ (らしい — 数学では滅多に使わない<sup>10</sup>)。

命題  $p \Rightarrow q$  が真であっても、その逆  $q \Rightarrow p$  が真であるとは限らない (「逆は**必ずしも**真ならず」)。

**定理 1.17** 任意の命題  $p$  と  $q$  に対して、命題  $p \Rightarrow q$  とその対偶  $(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$  の真偽は一致する。

$$p \Rightarrow q \equiv (\neg q) \Rightarrow (\neg p).$$

**証明** 略 (真理値表を書けば分かる。  $\Rightarrow$  を使わずに表して同値変形しても良い)。 ■

なお、裏は逆の対偶であるから、裏と逆の真偽は一致する。

**問 6.** 定理 1.17 を証明せよ。

### 1.9.2 必要条件、十分条件、必要十分条件

(この段階では、 $p, q$  は命題であり、条件ではないので、少しおかしい言葉遣いのような気がするが…§2 「述語論理」に回すべきか?)

命題  $p \Rightarrow q$  の真理値が T であるとき、 $p$  は  $q$  の**十分条件** ( $p$  は  $q$  が成り立つための十分条件)、 $q$  は  $p$  の**必要条件** ( $q$  は  $p$  が成り立つための必要条件) と呼ぶ。

命題  $p \Rightarrow q$  と  $q \Rightarrow p$  の真理値がともに T であるとき、 $p$  は  $q$  の**必要十分条件** である ( $p$  は  $q$  が成り立つための必要十分条件である) と呼ぶ。このことを  $p \Leftrightarrow q$  で表す。

もちろん、 $p$  と  $q$  について対称なので、 $p$  と  $q$  を入れ替えても良い。

## 2 述語論理

ここから (やっと) 数学らしくなる (まともな内容のある命題が記述できる)。

ただ1つの数学的対象を扱う場合はそれほど多くなく、複数 (しばしば無限個) の数学的対象に対して何か言及するのが重要である。例えば「平面内のすべての三角形について、その3つの内角の和は  $180^\circ$  である」。そういうものを取り扱うのに述語論理が必要になる。

**余談 2.1** 「大学初年級の微積分で、極限を定義するために、 $\varepsilon$ - $N$  論法、 $\varepsilon$ - $\delta$  論法というものがあり、そういうところで述語論理が必要になる」というような意味のことがしばしば言われる。私自身は長いこと知らなかったのですが、初めて聞いた時は「なるほど」と思ったのだが、良く考えてみると、 $\varepsilon$ - $N$  論法、 $\varepsilon$ - $\delta$  論法に限った話ではないことがすぐに分かる。代数系の公理<sup>11</sup>などは、述語論理の良い実例で、以下でもたくさん出てくる。 ■

<sup>10</sup>余談であるが、先日気楽なマンガを読んでいたら、数学的に裏と言うのが適切な状況で、登場人物が「裏を返せば…」と言っていて、少々びっくりした。国語的には間違っているような気がしたのだけれど、国語辞典を読んでも判然としない。

<sup>11</sup>例えば、結合法則のような法則や、単位元や逆元の存在など。

## 2.0 臨時講義: 数学で良く使う数の集合を表す記号

集合については、論理の後で解説するが、例を書くために、使えると便利なので以下の記号を前倒して紹介しておく。

$x$  が集合  $A$  の要素であることを  $x \in A$ ,  $x$  が集合  $A$  の要素でないことを  $x \notin A$  と書く。

記号	意味	由来
$\mathbb{N}$	自然数全体の集合 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$	natural numbers (自然数)
$\mathbb{Z}$	整数数全体の集合 $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$	Zahl (ドイツ語: 数)
$\mathbb{Q}$	有理数全体の集合	quotient (比)
$\mathbb{R}$	実数全体の集合	real numbers (実数)
$\mathbb{C}$	複素数全体の集合	complex numbers (複素数)

図 1: 良く使う数の集合の記号

(もともとは太字 (bold face)  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  を黒板に書くとき、文字の一部を二重線にすることで太字を書いたことにする習慣があつて、それが一般化したということらしい。TeX では、`\mathbb{N}` のように入力するが、`bb` は blackboard bold の略だとか。直訳すると「黒板太字」ですね。)

## 2.1 述語 (命題関数, 条件)

「 $x > 3$ 」は (実数)  $x$  の値を定めると真偽が確定して命題になる。このような変数  $x$  を含む主張を、 $x$  についての**条件** (condition)、**述語** (predicate)、**命題関数**と呼ぶ。

(predicate は [prédikət] と発音する。)

$x$  についての条件を、 $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $\dots$  のように表す (既に慣れている数の集合上で定義された関数の記法と似ているので、あまり抵抗はないであろう)。

前節で導入した命題に関する演算  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\Rightarrow$  を、条件に関しても適用する。(  $\neg$ ,  $\wedge$  は別にして、 $\vee$  や  $\Rightarrow$  はそういうとき初めて、じっくり感じられるのではないだろうか?)

述語論理では、**量称記号** (quantifier, **限定記号**ともいう) と呼ばれる記号  $\forall$ ,  $\exists$  が重要である。

## 2.2 「任意の」, 「すべての」, $\forall$

数学で出て来る命題の多くは、何かある一定の範囲のものについて、1つの例外もなく何かが成立する、という形のものが多し。このような命題を**全称命題** (universal proposition) という。典型的な表現は「すべての〇〇に対して $\sim$ が成り立つ」。

「すべての」は「任意の」と言い変えることもできる (「すべての」の方が日常語に近くて親近感が持てるかもしれないが)。「に対して」は「について」とも言い、「が成り立つ」は「が成立する」または「である」とも言うし、省略されることもある<sup>12</sup>。

言葉で表すときは、「すべての」や「任意の」は省略されることも多い。

「(すべての、任意の) 三角形について、(その三角形の3つの) 内角の和は2直角である。」

<sup>12</sup>(ほぼ雑談) 例えば「 $1+1=2$ である」, 「 $1+1=2$ が成り立つ」と言っても良いが、単に「 $1+1=2$ 」とするのが普通であろう。もっとも英語では、「 $1+1=2$ 」は “one plus one equals two.” あるいは “one plus one is equal to two.” と読むので、 $1+1=2$  それ自体が完全な文 (あるいは節) になっていると考えるべきであろう。日本語でも、「 $1+1=2$ 」を「いちたすいちにはにである」と読むべきかもしれない。あるいは日本語ではもともと「である」は省略可能で「いちたすいちにはに」で文とみなすべきかも。



「(すべての、任意の) 微分可能な関数は連続である」  
この講義では原則として省略しないことにする。期末試験が終わるまでお付き合いください。

「任意の  $x$  に対して  $p(x)$  が成り立つ」という命題を

$$\forall x \ p(x)$$

と表す。

$\forall$  は、**全称記号** (universal quantifier) と呼ばれる。“All” の先頭の文字 ‘A’ を逆立ちさせて作った記号である。

(豆知識)  $\text{\TeX}$  では `\forall` と入力すると  $\forall$  が出る。

例えば「すべての  $x$  に対して、 $x$  が実数ならば  $x^2 \geq 0$  が成り立つ」という命題を

$$\forall x \ x \text{ が実数} \Rightarrow x^2 \geq 0$$

と表す。

括弧  $()$ ,  $[\ ]$  を適当に補って

$$\forall x \ (x \text{ が実数} \Rightarrow x^2 \geq 0),$$

$$\forall x \ [x \text{ が実数} \Rightarrow x^2 \geq 0]$$

のようにも書く。かっこのつけ方は、使う人の好みというか、かなりいい加減である。

—  $\forall$  まとめ —

$p(x)$  を  $x$  についての条件 ( $x$  を定めると  $p(x)$  が命題となる) とする。

“For all  $x$ ,  $p(x)$  (holds)”, 「すべての  $x$  について  $p(x)$  (が成り立つ、である)」, 「任意の  $x$  に対して  $p(x)$  (が成り立つ、である)」という命題を

$$\forall x \ p(x) \quad \text{あるいは} \quad \forall x(p(x))$$

と書く。

上の例自体がそうであるように、数学で実際に現れる

$$\forall x \ p(x)$$

の形の命題で、 $p(x)$  は多くの場合、 $p_1(x) \Rightarrow p_2(x)$  という形をしている。 $p_1(x)$  を「前提条件」、  
「付帯条件」のように考えて、

$$(\forall x : p_1(x)) \ p_2(x)$$

と書くことがある。「 $p_1(x)$  が成り立つような任意の  $x$  に対して  $p_2(x)$  が成り立つ」のように読む。

上の例では

$$(\forall x : x \text{ は実数}) \ x^2 \geq 0.$$

集合の記号を使うと、「 $x$  は実数」は「 $x \in \mathbb{R}$ 」と書ける。すると

$$(\forall x : x \in \mathbb{R}) \ x^2 \geq 0$$

となるわけだが、しばしば

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \ x^2 \geq 0$$

と略記される。「実数であるような任意の  $x$  に対して  $x^2 \geq 0$ 」、あるいは「任意の実数  $x$  に対して  $x^2 \geq 0$ 」と読む。

その場の議論の流れから、 $x \in \mathbb{R}$  は当然の前提と考えて省略することもある。

$$(\forall x) \quad x^2 \geq 0$$

(この講義では、なるべくこういう省略はしないことにするが、普通の数学の本では時々ある。)

似たケースとして

$$(\forall x : x > 0) \quad x + \frac{1}{x} \geq 2$$

を

$$(\forall x > 0) \quad x + \frac{1}{x} \geq 2$$

と書くこともある。「任意の(すべての)正の数  $x$  に対して  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ 」

もう一つくらい例をあげておく。

$$(\forall \Delta : \Delta \text{ は三角形}) \quad \Delta \text{ の } 3 \text{ つの内角の和は } 180^\circ.$$

**注意 2.2 (受験生のいないテストは全員合格)** 教科書には、「すべての」「任意の」の意味に疑問は生じないというようなことが書いてあるが、

「〇〇の試験でのすべての受験生は合格した。」

(論理式に翻訳すると  $(\forall x: x \text{ は } \text{〇〇の試験の受験生}) x \text{ は合格した}$ )

という命題は、その試験を受験した人がいないとき、真であるか、それとも偽であるか。それほど明らかでない、と思う人が多いのではないだろうか。数学では受験した人がいない場合、上の主張は真であるとみなす。言い換えると、数学用語としての「すべて」「任意」はそういう意味であると約束する。■

**余談 2.3 (個人的な体験談から)** 昔、ある(当時そこそこ有名だった)定理の仮定すべてを満たす対象が実は存在しないことが後から分かった、という「事件」に出会ったことがある。定義でも定理でも、少なくとも一つ例をあげることが大事である、という良く言われる心得の大事さを痛感する出来事であった。論理について考察するための良い事例でもある。その定理の証明自体には間違いがなかった。要するに「仮定を満たす任意の  $x$  について、 $P(x)$ 」という形の定理で、その証明は正しく、真な命題であった。間違いではないが、ナンセンスな(何の役にも立たない)定理であった、というわけである。■

**余談 2.4 (ある年の期末試験)** 条件  $p(x)$  を満たす  $x$  全体の集合というのを

$$\{x \mid p(x)\}, \quad \{x ; p(x)\}, \quad \{x : p(x)\}$$

等で表すと習ったせいか、

$$(\forall x \mid x > 0) \quad x + \frac{1}{x} \geq 2 \quad (\text{これは変})$$

のように書く人が(複数)現れたことがある(|と:はいつでも同じように使えると勘違いしている?)。私は色々な数学書を読むけれど、こういう書き方をしている本を見たことはまだない。 $\forall$ の付帯条件を表すために|は使うべきではないと思う。■

## 2.3 「存在する」, 「ある」, $\exists$

「 $\sim$ を満たす(ような)  $\bigcirc\bigcirc$ が存在する」、「ある  $\bigcirc\bigcirc$ が存在して、 $\sim$ が成り立つ」、「ある  $\bigcirc\bigcirc$ に対して、 $\sim$ が成り立つ」、「ある  $\bigcirc\bigcirc$ が $\sim$ を満たす」という形の命題(意味はどれも同じ)も良く出て来る。

「 $x^3 - x + 1 = 0$  を満たす実数  $x$  が存在する。」

「ある実数  $x$  が存在して、 $x^3 - x + 1 = 0$  が成り立つ。」 (この表現を推奨する。)

「ある実数  $x$  に対して、 $x^3 - x + 1 = 0$  が成り立つ。」

「適当な実数  $x$  を取れば、 $x^3 - x + 1 = 0$  が成り立つ。」

このことを次のような式で表す。

$$\exists x \quad x \in \mathbb{R} \wedge x^3 - x + 1 = 0.$$

記号  $\exists$  は**存在記号**(existential quantifier)と呼ばれる。“exists”(「存在する」)の先頭の文字 ‘E’ を裏返して作ったと言われている(鏡文字というやつ。プーさんに出て来る。)

(豆知識)  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  では `\exists` と入力すると  $\exists$  が出る。

E と書き間違える人が時々いる。日本人限定迷った時の思い出し方「 $\exists$  は片仮名のヨに似ている」。

次のように括弧をつけることが多い。

$$\exists x \quad (x \in \mathbb{R} \wedge x^3 - x + 1 = 0).$$

$$\exists x \quad [x \in \mathbb{R} \wedge x^3 - x + 1 = 0].$$

—  $\exists$  まとめ —

$p(x)$  を  $x$  についての条件 ( $x$  を定めると  $p(x)$  が命題となる) とする。

“There exists  $x$  such that  $p(x)$  (holds)”, 「ある  $x$  が存在して、 $p(x)$  (が成り立つ, である)」, 「ある  $x$  に対して (について)、 $p(x)$  (が成り立つ, である)」, 「 $p(x)$  が成り立つような  $x$  が存在する」という命題を

$$\exists x p(x) \quad \text{あるいは} \quad \exists x(p(x)) \quad \text{あるいは} \quad \exists x [p(x)] \quad \text{あるいは} \quad \exists x \text{ s.t. } p(x)$$

で表す。

上の例がそうであるように、数学で実際に現れる

$$\exists x \quad p(x)$$

の形の命題で、 $p(x)$  は多くの場合、 $p_1(x) \wedge p_2(x)$  という形をしていて、 $p_1(x)$  が  $x$  の考察の範囲(例えば「 $x$  は実数である」, 「 $x \in \mathbb{R}$ 」など)を示している。そういうとき、

$$\exists x \quad p_1(x) \wedge p_2(x)$$

という命題を、「 $p_1(x)$  を満たす  $x$  で、 $p_2(x)$  が成り立つものが存在する」のように読むことがある(当然の前提  $p_1(x)$  をそうでないものと分ける<sup>13</sup>)。それに対応して

$$(\exists x : p_1(x)) \quad p_2(x)$$

<sup>13</sup>例えば上の例では、 $x \in \mathbb{R}$  でないと  $x^3 - x + 1$  という式そのものがナンセンスということもあり、 $x \in \mathbb{R}$  と  $x^3 - x + 1 = 0$  が対等という感じはしないであろう。

のように書くことが多い。

上の例では

$$(\exists x : x \in \mathbb{R}) \quad x^3 - x + 1 = 0$$

となる。これをさらに

$$(\exists x \in \mathbb{R}) \quad x^3 - x + 1 = 0$$

と略記することが多い。「実数  $x$  で  $x^3 - x + 1 = 0$  を満たすものが存在する」, 「ある実数  $x$  が存在して、 $x^3 - x + 1 = 0$  が成り立つ」と読むとしっくりする。

同様に

$$\exists x \quad (x > 0 \wedge x^2 = 2)$$

を

$$(\exists x > 0) \quad x^2 = 2$$

のように書くことが多い。

**注意 2.5 (s.t. について)**  $\exists$  を含む論理式で、 $\exists$  の直後に、しばしば “s.t.  $\sim$ ” (「 $\sim$  のような」, such that の省略形) が使われる。例えば

$$(\exists x \in \mathbb{Q}) \quad x^2 = 2$$

を

$$(\exists x \in \mathbb{Q}) \quad \text{s.t.} \quad x^2 = 2$$

と書く<sup>14</sup>。英語を使う人は、“There exists  $x \in \mathbb{Q}$  such that  $x^2 = 2$ .” (「 $x^2 = 2$  が成り立つような  $x \in \mathbb{Q}$  が存在する。」) と読むので、s.t. をつけるのがしっくり来るのであろう。s.t. はあってもなくても良い。この講義ではつけないことにする。

これについて一つ注意しておこう。「 $\exists x \in \mathbb{Q}$  s.t.  $x^2 = 2$ 」の否定命題を作るときなどに、s.t. を残して

$$\forall x \in \mathbb{Q} \quad \text{s.t.} \quad x^2 \neq 2$$

とする人がたまにいるけれど、それははつきりと変である。(これは「すべての  $x \in \mathbb{Q}$  に対して  $x^2 \neq 2$  が成り立つ」と読む式で、「 $\sim$  のような」とは読まない)。■

## 2.4 複数の量称を含む命題 (工事中)

このところこの項の更新をサボっていたけれど、久しぶりに授業内容に近づけた (2022/8/23)。まだ少し粗いところが残っている。

### 2.4.1 複数の変数を含む述語

2つ以上の変数を含む述語 (条件) がある。

**例 2.6 (2変数  $x, y$  についての述語)**  $xy = x$  は、 $x$  と  $y$  に数を代入すると命題になる。

$x = 0, y = 0$  を代入すると  $0 \cdot 0 = 0$  となり、真な命題である。

$x = 1, y = 0$  を代入すると  $1 \cdot 0 = 1$  となり、偽な命題である。■

<sup>14</sup>この命題は偽である。偽な命題を例にあげると、時々質問されたりするので、念のため。

2変数  $x, y$  を含む述語は、 $p(x, y)$  のように表せる。

2変数  $x, y$  を含む述語  $p(x, y)$  に対して、

$$\forall y p(x, y) \quad \text{と} \quad \exists y p(x, y)$$

は、どちらも  $x$  についての述語になる。

### 例 2.7

$$(4) \quad (\forall y \in \mathbb{R}) \quad xy = x,$$

$$(5) \quad (\exists y \in \mathbb{R}) \quad xy = x.$$

いずれも、変数  $x$  についての述語である。例えば

- (4) に  $x = 0$  を代入すると  $(\forall y \in \mathbb{R}) \quad 0 \cdot y = 0$       これは真な命題である。
- (4) に  $x = 1$  を代入すると  $(\forall y \in \mathbb{R}) \quad 1 \cdot y = 1$       これは偽な命題である。
- (5) に  $x = 0$  を代入すると  $(\exists y \in \mathbb{R}) \quad 0 \cdot y = 0$       これは真な命題である。
- (5) に  $x = 1$  を代入すると  $(\exists y \in \mathbb{R}) \quad 1 \cdot y = 1$       これは真な命題である。 ■

$(\forall y \in \mathbb{R}) \quad xy = x$  も、 $(\exists y \in \mathbb{R}) \quad xy = x$  も、変数  $x$  についての述語であるから、さらに  $\forall x$  あるいは  $\exists x$  をつけて命題となる、ということである。

2つの変数を持つ述語については、 $\forall x(\forall y p(x, y))$ ,  $\exists x(\forall y p(x, y))$ ,  $\forall x(\exists y p(x, y))$ ,  $\exists x(\exists y p(x, y))$  という4つのパターンがあることになる。赤いカッコ ( ) は省略されることが多い。

#### 2.4.2 複数の変数を含む述語の読み方

式で書かれた複数の変数を含む述語をどう読むかを説明する。

まず量称が2つの場合を説明する。日本語の文を式に変換するときと異なり、式を日本語に直すやり方は色々ありうるが、私としては、次のように左から右に機械的に翻訳して読むことを勧める。

- $\forall x \forall y p(x, y)$       「任意の  $x$  と任意の  $y$  に対して  $p(x, y)$  が成り立つ<sup>15</sup>」、 「任意の  $x, y$  に対して  $p(x, y)$  が成り立つ」 — 論理式の方も  $(\forall x, y)p(x, y)$  と略記することがある。
- $\forall x \exists y p(x, y)$       「任意の  $x$  に対して、ある  $y$  が存在して  $p(x, y)$  が成り立つ」
- $\exists x \forall y p(x, y)$       「ある  $x$  が存在して、任意の  $y$  に対して  $p(x, y)$  が成り立つ」
- $\exists x \exists y p(x, y)$       「ある  $x$  とある  $y$  が存在して  $p(x, y)$  が成り立つ<sup>16</sup>」、 「ある  $x, y$  が存在して  $p(x, y)$  が成り立つ」 — 論理式の方も  $(\exists x, y)p(x, y)$  と略記することがある。

<sup>15</sup> 「任意の  $x$  に対して、任意の  $y$  に対して  $p(x, y)$  が成り立つ」と言っても間違いではないと思うが、そうする人は少ないようで、少し短くするのが普通のようなのである。

<sup>16</sup> 「ある  $x$  が存在して、ある  $y$  が存在して  $p(x, y)$  が成り立つ」と言っても間違いではないと思うが、そうする人は少ないようで、少し短くするのが普通のようなのである。

要点は、左から右に順に式をたどり、 $\forall \bigcirc$ があれば「任意の $\bigcirc$ に対して」、 $\exists \square$ があれば「ある $\square$ が存在して」と機械的に読み下し、順番は決して入れ換えないことである。

このやり方は、英語では特に問題が生じないが、日本語では出来た文が不自然なものになりがちである。そのため、日本語として自然な文になるように工夫を試みる人がいるが、意味が曖昧な文になってしまったり、かえって読みにくくなったりするので、私としては、「機械的翻訳方針」をお勧めする。特に量称の個数が多い場合(量称が5個以上ある論理式もごく普通に登場する)、読み方の工夫は手詰まりになりやすい。

以上、結論を天下一りに述べたが、实例を題材にして説明しよう。まず次の2つの命題

$$(6) \quad (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \quad x < y,$$

$$(7) \quad (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) \quad x < y$$

を考えてみよう。

機械的翻訳方針で読むと、それぞれ次のようになる。

(6a) 「任意の実数  $x$  に対して、ある実数  $y$  が存在して  $x < y$  が成立する。」

(7a) 「ある実数  $y$  が存在して、任意の実数  $x$  に対して  $x < y$  が成立する。」

(6a) は、どんな実数に対しても、それより大きい実数がある、ということで、これは真な命題である(証明の書き方は後述する)。

一方、(6b) は、どんな実数よりも大きいような(チャンピオンの?) 実数があるという意味で、これは偽な命題である。

「ある $\bigcirc\bigcirc$ が存在して $\sim$ 」という表現を嫌って、「 $\sim$ となるような $\bigcirc\bigcirc$ が存在する」を使おうとして、(6), (7) を次のように読む人もいる。

(6b) 「任意の実数  $x$  に対して、 $x < y$  が成り立つような実数  $y$  が存在する。」

(7b) 「任意の実数  $x$  に対して  $x < y$  が成り立つような実数  $y$  が存在する。」

個人的な意見ということになるかもしれないが、(6b) と (7b) はとても紛らわしいと思う。読点「、」を見落とさなければ大丈夫(区別できる)という意見もあるけれど、それは聴いただけでは分からない。

機械的な翻訳方針を採用して、(6a) と (7a) のように読むことを勧める。

**例 2.8**  $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \quad x > y$

「任意の実数  $x$  に対して、ある実数  $y$  が存在して  $x > y$  が成り立つ。」

これは真な命題である。どんな  $x$  に対しても  $y = x - 1$  とすれば…証明の書き方は後述する。 ■

**例 2.9**  $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{N}) \quad x > y$

「ある実数  $y$  が存在して、任意の自然数  $x$  に対して  $x > y$  が成り立つ。」

これも真な命題である。 $y = -1$  とすれば… ■

**例 2.10** ( $\forall$  が連続する場合)

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) \quad x^2 + y^2 \geq 2xy$$

機械的に読むと「任意の実数  $x$  に対して、任意の実数  $y$  に対して  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ 。」となるが、日本語としてやや不自然な感じがする。普通は「任意の実数  $x$ , 任意の実数  $y$  に対して  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ 。」あるいは「任意の実数  $x, y$  に対して  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ 。」と読む。 ■

**例 2.11 (∃ が連続する場合)**  $(\exists x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N}) x^2 + y^2 = 25.$

「ある自然数  $x, y$  が存在して  $x^2 + y^2 = 25.$ 」と読む。■

3つ以上の変数を持つ述語に対しても同様である。

**例 2.12 (3変数の場合、ピタゴラス数)** 3つでも同様で

$$\exists x \exists y \exists z (x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge z \in \mathbb{N} \wedge x^2 + y^2 = z^2)$$

を次のように書く。

$$(\exists x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})(\exists z \in \mathbb{N}) x^2 + y^2 = z^2$$

「ある自然数  $x, y, z$  が存在して  $x^2 + y^2 = z^2$ 」

この命題は真である。 $x = 3, y = 4, z = 5$  とすると条件を満たす。■

付帯条件がある量称の場合も同様である。— これはどこに入れよう？

**例 2.13 (連続関数の定義)** 関数  $f$  が点  $a$  で連続であるとは、条件「任意の正の数  $\varepsilon$  に対して、十分小さな正の数  $\delta$  が存在して、 $|x - a| < \delta$  を満たすすべての  $x$  に対して、 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 」が成り立つことと定義する。この ( $f$  と  $a$  に関する) 条件は

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x : |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

と書ける。元々の流儀 (付帯条件を使わない) で書くのは、かなり面倒でわかりづらくなる (興味ある人は試してみるとよい)。■

以下は雑談である。論理式の読み方をどうするかという問題は、初めて学んだときからずっと抱えているが、現時点での個人的な結論は次のようになっている。

- 機械的に翻訳し、それを読むことに慣れるのが、結局はコストが一番低い。
- 複雑な論理式は、無理に日本語に直さない。どうしても日本語に直す場合は、新しく言葉や記号を定義してそれを用いることで、短い論理式に書き直した上で、日本語に翻訳する。

この問題は、英語と日本語の違いに起因している面があるような気がする (英語ならば関係代名詞を使うと、式に書いた順を守った文が自然に出来る)。

### 2.4.3 量称記号の順序

量称記号の順序を交換するとどうなるだろうか。∀ 同士、∃ 同士は交換しても同値である。すなわち

$$(1) (\forall x) (\forall y) P(x, y) \equiv (\forall y) (\forall x) P(x, y)$$

$$(2) (\exists x) (\exists y) P(x, y) \equiv (\exists y) (\exists x) P(x, y)$$

∀ と ∃ を交換すると同値とは限らない。例えば  $(\exists x) (\forall y) P(x, y)$  が真ならば、 $(\forall y) (\exists x) P(x, y)$  も真であるが、 $(\forall y) (\exists x) P(x, y)$  が真であっても、 $(\exists x) (\forall y) P(x, y)$  が真とは限らない。

例 2.14 「どんな数に対しても、それより大きな数がある」は

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \quad y > x$$

と表され、真な命題であるが、量称を入れ替えた

$$(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) \quad y > x$$

は「どんな数よりも大きい数(チャンピオンの数)がある」という強い意味になり、(そんなことはありえないので) 偽な命題である。■

### 重要

$\forall$  同士、あるいは  $\exists$  同士は、順番を入れ換えても式の意味(内容)は変わらないが、 $\forall$  と  $\exists$  の順番は入れ換えると意味が変わってしまう。

(§2.6 で見るように) 一般に “ $\exists y \forall x P(x) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$ ” が成り立つから、 $\exists$  が先に現れる方が強い主張である。

例 2.15 (じゃんけん) 3点からなる集合  $J = \{\text{ぐう}, \text{ちょき}, \text{ぱあ}\}$  に、次のような 2 項関係  $\succ$  を導入する。

$$\text{ぐう} \succ \text{ちょき}, \quad \text{ちょき} \succ \text{ぱあ}, \quad \text{ぱあ} \succ \text{ぐう}$$

これ以外の場合は、 $\succ$  は不成立とする(要するに「じゃんけん」の勝ち負けの判定)。例えば、 $\text{ぱあ} \not\succeq \text{ちょき}$ 。こうすると、

$$(\forall t \in J)(\exists k \in J) \quad k \succ t$$

(どんな手  $t$  に対しても、それに勝つ手  $k$  がある) は真であるが、

$$(\exists k \in J)(\forall t \in J) \quad k \succ t$$

(どんな手  $t$  に対しても勝ってしまう“必勝手”  $k$  がある) は偽である。■

例 2.16 (Archimedes の公理) 2つの正の実数  $a, b$  を取ったとき ( $b$  がどんなに大きくても、あるいは  $a$  がどんなに小さくても)、 $a$  を十分たくさん足してやれば  $b$  を追い抜く。

$$(\forall a > 0)(\forall b > 0)(\exists n \in \mathbb{N}) \quad na > b.$$

これは公理というくらいで、真な命題であるが<sup>17</sup>、 $(\forall b > 0)$  と  $(\exists n \in \mathbb{N})$  を入れ替えた

$$(\forall a > 0)(\exists n \in \mathbb{N})(\forall b > 0) \quad na > b$$

は偽である。■

次の例は有名かつ重要である(残念ながら 1 年生の 5 月頃に持ち出す例としてはフライング気味かもしれない)。

例 2.17 (連続性と一様連続性)  $I$  を  $\mathbb{R}$  の区間、 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  を写像とする。 $f$  が  $I$  で連続であるということを論理記号で書くと

$$(\forall x \in I)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall y \in I: |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

となる。また、 $f$  が  $I$  で一様連続であるということを、論理記号で書くと

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in I)(\forall y \in I: |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

となる。

連続性と一様連続性は異なる概念であるが、それが  $\forall, \exists$  の順番の違いだけで表されている。

<sup>17</sup>実数全体の集合を構成する議論を行う場合は、証明可能な命題(定理)となるが、それをさぼって、実数全体の集合が持ついくつかの性質を公理として認めて議論を始める立場では、公理とする必要がある(他の公理からは導かれない) ことのある命題である。



## 2.5 量称を含む命題の証明

「次の命題を証明せよ」に対してフリーズする前に、ダメもとでやってみるべきことがある。それを2つ紹介する。

どんな(正しい)命題も証明出来るような万能の方法はないが(そういうものがあれば、数学者は苦勞しないのだけど)、ぜひ試すべきことがある(ほぼ繰り返して、くどいかな)。

その1

命題  $(\forall x: P_1(x)) P_2(x)$  を証明するには、まず「 $x$  は  $P_1(x)$  を満たす任意のモノとする」という意味のことをとにかく書いてしまう。それから  $P_2(x)$  であることが証明できないか考えてみる。

### 例 2.18

$$(8) \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad x^2 \geq 0$$

を証明しようとする場合、まず「 $x$  を任意の実数とする」と書いてしまう。それから  $x^2 \geq 0$  を導くことを目標として考える。

(証明)  $x$  を(任意の)実数とする。 $x > 0$ ,  $x = 0$ ,  $x < 0$  のいずれかが成り立つ。

$x > 0$  の場合、 $x^2 = x \cdot x > 0$  (2つの正の数の積は正)。

$x = 0$  の場合、 $x^2 = 0^2 = 0$ 。

$x < 0$  の場合、 $-x > 0$  であるから、 $x^2 = (-x)^2 > 0$  (2つの正の数の積は正)。

いずれの場合も  $x^2 \geq 0$  であるから、(8) が証明出来た。 ■

**注意 2.19** (「任意の」を書くのをサボるかサボらないか) 普通の数学書の証明では、「任意の」を省いて「 $x$  を実数とする」とだけ書いてあることが多い。他に何も書いていなければ、それ以外の条件は一切課さないという意味で「任意」であることが明らかである、ということであろう。特に上の証明では、証明の文章の先頭に書いてあるので、 $x$  がそこで初めて導入されたものであることがわかりやすい。そのため「任意の」がなくても誤解が生じる可能性はないであろう。

逆に言うと、文章の途中では、「任意の」を書いておいた方が、誤解が生じにくくて良い面がある。「任意の  $x$ 」という表現は、 $x$  を導入する時にしか使えない表現であるので、それが書いてあると、 $x$  がすでに導入済みであるか調べるために文章をさかのぼって読み返す必要がなくなる(これは「ある  $x$  が存在して」についても同様である)。

この講義では「任意の」を省略しないことにする。 ■

その2

命題  $(\exists x: P_1(x)) P_2(x)$  は、 $(\exists x) P_1(x) \wedge P_2(x)$  という意味である。そこで  $P_1(x)$  と  $P_2(x)$  を同時に満たすような  $x$  を探す。もしも実際に見つけることができれば、それで証明はほぼ完了する。

### 例 2.20

$$(9) \quad (\exists x \in \mathbb{R}) \quad x^2 - 3x + 2 = 0.$$

(計算用紙に  $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$  とか書いて、方程式の解が1, 2であることが分かれば、以下のような解答が書ける。)

(証明)  $x = 1$  とすると、 $x \in \mathbb{R}$ , かつ

$$x^2 - 3x + 2 = 1^2 - 3 \cdot 1 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0.$$

ゆえに (9) が成り立つ。 ■

### 例 2.21

$$(10) \quad (\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) \quad x + y = 0.$$

(証明)  $x$  を任意の整数とする。そのとき  $y = -x$  とおくと、 $y \in \mathbb{Z}$  であり、

$$x + y = x + (-x) = 0.$$

ゆえに (10) が証明出来た。 ■

### 例 2.22

$$(11) \quad (\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) \quad x + y = y.$$

先頭が  $\exists x$  であるから、 $x$  を具体的に見つけられれば良い。「 $(\forall y \in \mathbb{Z}) x + y = y$ 」を満たすような整数  $x$  というのが分かるだろうか。

(証明)  $x = 0$  とすると、 $x \in \mathbb{Z}$  であり、かつ任意の  $y \in \mathbb{Z}$  に対して、

$$x + y = 0 + y = y.$$

ゆえに (11) が証明出来た。 ■

もちろん、いつもそういう単純な話で済むわけでない。

### 例 2.23

$$(12) \quad (\exists x \in \mathbb{R}) \quad x^3 - x + 1 = 0.$$

この方程式は具体的に解けないこともないが、少し難しい<sup>18</sup>。

(証明) 関数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  を  $f(x) := x^3 - x + 1$  で定めると、 $f(x)$  は  $x$  の多項式であるから、 $f$  は連続関数で、

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(-2) = -8 - (-2) + 1 = -5 < 0.$$

中間値の定理により、ある  $x \in (-2, 0)$  が存在して  $f(x) = 0$ 。このとき  $x$  は実数で  $x^3 - x + 1 = 0$ 。

(ゆえに (12) が証明出来た。) ■

---

<sup>18</sup>Cardano の公式を使うと、 $x = -\sqrt[3]{\frac{2}{3(9-\sqrt{69})}} - \sqrt[3]{\frac{9-\sqrt{69}}{18}}$  が実数解と分かる。これが  $x^3 - x + 1 = 0$  を満たすことの確認も一目ではわかりづらい。




図 2:  $f(x) = x^3 - x + 1$  のグラフ

## 2.6 量称と論理の法則、特に否定命題

**定理 2.24** 以下の公式 (1)~(7) が (任意の述語  $P(x)$ ,  $Q(x)$  について) 成り立つ。

$$(1) \neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x)).$$

$$(2) \neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x)).$$

$$(3) \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)).$$

$$(4) \exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)).$$

$$(5) \forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y).$$

$$(6) \exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y).$$

$$(7) \exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y).$$

**注意 2.25 (反例)** 最初の公式は、「任意の  $x$  に対して  $P(x)$  が成り立つ」の否定は「 $P(x)$  が成り立たないような  $x$  が存在する」ということで、高校数学で学んだ「反例」という言葉を思い出す人もいるであろう。 $\forall x P(x)$  という形をしている命題に対して、反例というのは  $\neg P(x)$  を満たす具体的な  $x$  のことを指す。そういう  $x$  が発見できたとき、 $(\exists x) \neg P(x)$  は真である。つまり、反例を見つけることで否定命題を証明し、もとの命題が偽であることが証明できた、ということである。■

**注意 2.26** (3) で  $\wedge$  の代わりに  $\vee$  としたもの

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) \quad (\text{この式は正しくない})$$

は成り立たない。例えば  $P(x)$  を「 $x$  が偶数である」、 $Q(x)$  を「 $x$  が奇数である」とするとき、左辺は真であるが、右辺は偽である。

また (4) で  $\vee$  の代わりに  $\wedge$  としたもの

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x)) \quad (\text{この式は正しくない})$$

も成り立たない。■

**注意 2.27** (7) だけ  $\equiv$  でなく、 $\Rightarrow$  であることに注意しよう。一言でまとめると  $\forall$  同士、 $\exists$  同士は順序を入れ換えてもよいが、 $\forall$  と  $\exists$  を入れ換えることはできない (意味が変わってしまう)。■

付帯条件付きの量称  $(\forall x : A(x))$ ,  $(\exists x : A(x))$  に対しても、上と同様の公式が成り立つ。

**系 2.28** (1)  $\neg(\exists x : A(x))P(x) \equiv (\forall x : A(x))(\neg P(x))$ .

(2)  $\neg(\forall x : A(x))P(x) \equiv (\exists x : A(x))(\neg P(x))$ .

(3)  $(\forall x : A(x))(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x : A(x))P(x) \wedge (\forall x : A(x))Q(x)$ .

(4)  $(\exists x : A(x))(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x : A(x))P(x) \vee (\exists x : A(x))Q(x)$ .

(5)  $(\exists x : A(x))(\exists y : B(y))P(x, y) \equiv (\exists y : B(y))(\exists x : A(x))P(x, y)$ .

(6)  $(\forall x : A(x))(\forall y : B(y))P(x, y) \equiv (\forall y : B(y))(\forall x : A(x))P(x, y)$ .

(7)  $(\exists y : B(y))(\forall x : A(x))P(x, y) \Rightarrow (\forall x : A(x))(\exists y : B(y))P(x, y)$ .

**証明** 最初の二つを確認する。

$$\begin{aligned} \neg((\forall x : A(x))P(x)) &\equiv \neg(\forall x A(x) \Rightarrow P(x)) \equiv \neg(\forall x(\neg A(x) \vee P(x))) \\ &\equiv \exists x \neg(\neg A(x) \vee P(x)) \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg P(x)) \\ &\equiv (\exists x : A(x))\neg P(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg((\exists x : A(x))P(x)) &\equiv \neg(\exists x A(x) \wedge P(x)) \equiv \forall x \neg(A(x) \wedge P(x)) \\ &\equiv \forall x \neg A(x) \vee \neg P(x) \equiv \forall x A(x) \Rightarrow \neg P(x) \\ &\equiv (\forall x : A(x))\neg P(x). \end{aligned}$$

他も同様に証明できる。■

# 付録

## A 結合の優先順位

複数の論理記号が含まれる式を書くとき、結合の順番を表すためにカッコ ( ) を用いる。  
例えば、 $p \wedge (q \vee r)$  と  $(p \wedge q) \vee r$  から括弧を取って  $p \wedge q \vee r$  としてしまうと、意味が分からなくなる。

数の演算でそうしたように、論理式についても、カッコを減らすために、演算に優先順位を設けて、カッコを適度に省略する。以下の 1~5 では、小さい番号の演算の優先順位が高い。

1.  $=, \in$
2.  $\neg, \forall x, \exists x$
3.  $\wedge, \vee$
4.  $\Rightarrow$
5.  $\Leftrightarrow$

( $\Rightarrow$  と  $\Leftrightarrow$  の優先順位は同じ、という人もいる。)

例えば

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee q)$$

は

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

と書くことが出来る。

上のルールにおいても、 $\wedge$  と  $\vee$  は同じ優先順位なので、 $\wedge$  と  $\vee$  が混じる式では、やはりカッコ ( ) をつけることが必須であることを注意する必要がある。(  $\wedge$  を論理積、 $\vee$  を論理と呼ぶせいか、数の演算との類推から  $\wedge$  を優先して、 $(p \wedge q) \vee r$  を  $p \wedge q \vee r$  と書ける、と誤解している人が多いような気がするが、そうではない。)

## B トートロジー

命題  $P, Q, \dots$  を命題結合記号 ( $\vee, \wedge, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ ) を使って組み合わせた命題で、 $P, Q, \dots$  がいかなる命題であっても、つねに真であるようなものを、トートロジー (tautology) または恒真命題と呼ぶ。

例として、 $P \vee (\neg P)$

三段論法

$$(13) \quad ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

構成的仮言の三段論法

$$(14) \quad (P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$$

$$(15) \quad ((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow ((P \vee Q) \Rightarrow R)$$

## C ユークリッドの原論 — 証明の起源

証明は、ギリシャ数学に起源があるとされている。「ヒポクラテスの三日月」で知られているキオスのヒポクラテス (B.C. 450–420) が証明の発明者であるという説が有力らしい (斎藤 [8])。まとまった形で残っているものとしては、何と言っても「ユークリッド原論」 [7] が有名である。

「ユークリッド原論」は、アレキサンドリアのエウクレイデス (*Ευκλείδης*, B. C. 3世紀頃, 英語読みでは Euclid ユークリッド) が著したストケイア (*Στοιχεία*, 英語では Elements, 日本語では「原論」) という書物である。その当時まで得られていた数学の多く<sup>19</sup>を集成したもの。

古い話のようだけれど、現代の数学の直接の祖先であり、現代の数学の骨格を決めているようなところがある。そして学校数学 (高等学校までの数学) は、少なくとも見掛け上そうなっていないので、1年生に話す価値 (もしかすると必要性かもしれない) は高い。

それに先立つ他の文化圏 (古代バビロニア、古代エジプト、古代中国) で証明が行われた形跡はなく、その後も再発見されたという話はないようである。(個々の事実は、歴史上何度も再発見されているのに、証明するという行為自体は再発見されなかった?)

原論は、全13巻からなる (平面図形, 面積の変形 (“幾何的代数”), 円の性質, 円に内接・外接する多角形, 比例論, 比例論の図形への応用, 数論 (3巻), 無理量論, 立体図形, 面積・体積, 正多面体)。いくつかの定義 ( $23+2+11+7+18+4+22+0+0+(4+6+6)+29+0+0 = 132$ ) と、5 (or 9) つの公理、5つの公準から、465 ( $= 48+14+37+16+25+33+39+27+36+115+39+18+18$ ) 個の命題を証明した。

さすがに現代の観点からは、証明に色々な不備が認められるが、掲げられた命題自体に間違いはないと言われている。これは非常に驚くべきことである。

### 9つの公理 (準備中)

### 5つの公準 (準備中)

**QED のルーツ** 今でも証明の終わりに QED と書くことがあるが、これは原論のラテン語訳で命題の証明の最後に書かれている “quod erat demonstrandum” (もとのギリシャ語では ὅπερ εἶδει δεῖξαι. 英語で言うと “which had to be demonstrated”, 「これが証明すべきことであった」という意味) の省略形である。

## D 基本的な用語・言葉遣い

### D.1 議論の中での記号の定義

1つの数学的対象を、文字や文字を組み合わせたもの等の1つの記号で表すことが良く行われる。

「 $p$  を命題とする。」

「 $x$  を任意の実数とする。」

「 $A, B$  を集合とするとき、…」

特にこれまでの議論に現れた対象を用いた式で新しい対象を定義して、それを一つの記号で表すとき、「記号 = 式 とおく」または「記号 = 式 とする」と書く。例えば  $x, y$  が既に定義済みであるとして、「 $z = (x + y)^2$  とおく」のように書いたりする。

<sup>19</sup>例えば、円錐曲線論は、ほかならぬエウクレイデスの著作があつたらしいが、これは原論には含まれておらず、現在では残っていない (後から現れたアポロニオスの円錐曲線論に取って代わられたと言われている)。

「 $a$  と  $b$  が等しい」という命題は、 $a = b$  と書いても  $b = a$  と書いても、どちらでも同じことだが、この定義の場合は  $z = (x + y)^2$  の方が普通で、 $(x + y)^2 = z$  とは書くことは少ない。

日本語では、「 $z$  で  $(x + y)^2$  を表すことにする」よりは「 $(x + y)^2$  を  $z$  で表す」のが自然そうなので、ともすると「 $(x + y)^2 = z$  とおく」(一般化すると「式 = 記号」)と書きそうになるが、それは普通でないといわれる。英語では、例えば“Let  $z$  be  $(x + y)^2$ ”という表現になるので、 $z$  が先、 $(x + y)^2$  が後、というのを自然に感じるらしい。

(脱線になるが、BASIC というプログラミング言語では、 $A$  に  $B$  を代入する命令文を  $LET A=B$  と書く。言語を作った人の頭の中で“Let A equal B”とか、“Let A be B”となっているのだろう。)

定義をするための等号は、単なる等式を構成するための等号とは異なると思えるべきかも知れない。しばしば  $z \stackrel{\text{def.}}{=} (x + y)^2$  のように  $\stackrel{\text{def.}}{=}$  を使うことがある。それ以外に  $z := (x + y)^2$  という書き方もある(そういえば、Pascal のような ALGOL の子孫であるプログラミング言語では、代入文は  $a := b$  と書くのであった)。 $:=$  は右辺の式の表すものを左辺の記号で表すという意味を含んでいる。

しばしば  $(x + y)^2 := z$  という書き方も目にするがある。 $(x + y)^2$  と  $z$  の語順が「普通」と逆になっているが、 $:=$  のせいで、左辺が式で、右辺が記号ということが明瞭である。

## D.2 公理とは

公理とは何か。重要な用語なので国語辞典にも載っていて、多くは次の二つの意味が載っている(ここでは広辞苑から引用した)。

- (a) 証明不可能であるとともに、また証明を必要とせず直接に自明の真として承認され他の命題の前提となる根本命題。
- (b) ある理論領域で仮定される基本前提。この場合、公理は自明な真理ではなく、公理系のとり方によって定まる。従ってある公理系で公理である命題も、他の公理系においては公理から証明される定理となることや、また偽となることがある。

ユークリッド原論における公理 (axiom, common notion) と、公準 (postulate) は (a) の意味での公理である。Euclid 原論の公理は相等関係が満たすべきルールなどのいわゆる推論のための規則で、公準が幾何学のための「自明の真として承認される命題」である。

## E 授業の進行

(ここは最近の事情に合わせて更新すべきである…ここ数年、論理の説明に授業5回近くの時間がかかっている。量称を含む命題の証明の仕方の説明など、内容的に増えているということもある。)

どういうペースで講義するかを参考にするため。

第1回 30~40分程度のガイダンスを行う(それはこの文書とは別の資料に基づく)。§1.3 か §1.4 まで進める。初回なので宿題はなし。

第2回 前回の続きから始め、§1.5, §1.7 が主な内容となる。宿題を出す(内容は真理値表による証明、もしかすると同値変形による証明も)。

第3回 宿題の解説。§1.8 あたりが残っている。続いて第2節「述語論理」に入る。§2.2, §2.3 を終わらせたい。宿題は量称を含む命題の翻訳(文  $\Leftrightarrow$  式)。

第4回 宿題の解説。§2.4, §2.5, §2.6 結構ずっしり。(以前は「空集合の論理」という話をしていたが、今は集合について述べる Part II で話をする。)宿題は、複数の量称を含む命題、量称を含む命題の証明。後者は1回ではマスター出来ない人が多いが、まずは最初のトライアル。

## F 解答

解答 1. 真理値表は

$p$	$q$	$r$	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

となる。5列目と8列目の真理値が一致するので、(♡) が成り立つ。 ■

解答 2. (これは自分でやってみよう。授業でどちらか一方を見せるはずであるから、その真似をしてもう一方を自分でやってみる、のが標準的な授業進行である。)

解答 3. 真理値表は

$p$	$q$	$r$	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$	$((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T



となる。真理値がつねに T であるから、 $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$  はトートロジーである。■

**解答 4.** (1) 最初に確認しておく。すでに

$$(16) \quad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

という分配律は述べてあり、交換律と同値変形により

$$(17) \quad (p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

が成り立つことも分かっている。 $r \vee s$  を  $M$  とおくと、

$$\begin{aligned} (p \vee q) \wedge (r \vee s) &\equiv (p \vee q) \wedge M \\ &\equiv (p \wedge M) \vee (q \wedge M) \\ &\equiv (p \wedge (r \vee s)) \vee (q \wedge (r \vee s)) \\ &\equiv ((p \wedge r) \vee (p \wedge s)) \vee ((q \wedge r) \vee (q \wedge s)) \\ &\equiv (p \wedge r) \vee (p \wedge s) \vee (q \wedge r) \vee (q \wedge s). \end{aligned}$$

**解答 5.**

$p$	$q$	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

$((\neg p) \vee q)$  の真理値表

**解答 6.** 同値変形によって証明する。 $p \Rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$  の  $p, q$  に、それぞれ  $\neg q, \neg p$  を代入すると

$$\begin{aligned} (\neg q) \Rightarrow (\neg p) &\equiv (\neg(\neg q)) \vee (\neg p) \\ &\equiv q \vee (\neg p) \\ &\equiv (\neg p) \vee q \\ &\equiv p \Rightarrow q. \end{aligned}$$

ゆえに  $p \Rightarrow q \equiv (\neg q) \Rightarrow (\neg p)$ . ■

## 参考文献

- [1] 中島匠一：集合・写像・論理 — 数学の基本を学ぶ, 共立出版 (2012).
- [2] 中内伸光：ろんりの練習帳, 共立出版 (2002).
- [3] 新井紀子：数学は言葉 — math stories, 東京図書 (2009), 数理論理の専門家によって比較的最近書かれた本であり、とても参考になる。
- [4] 結城浩：数学文章作法 基礎編, ちくま学芸文庫, 筑摩書房 (2013).

- [5] 島内剛一：数学の基礎, 日本評論社 (1971).
- [6] 前原昭二：数理論理学序説, 共立出版 (1966, 2010).
- [7] ユークリッド：ユークリッド原論, 共立出版 (1971, 2011/5/25 (追補版)), 中村幸四郎, 寺阪英孝, 伊藤俊太郎, 池田美恵 訳・解説.
- [8] 斎藤憲：キオスのヒポクラテスと論証数学の発明, 第17回ギリシャ哲学セミナー講演, <http://greek-philosophy.org/ja/files/2013/03/Saito2013.pdf> — こういうものを公開していただけるのはとてもありがたい (2013).

# 索引

conjunction, 6

corollary, 4

disjunction, 7

existential quantifier, 19

lemma, 4

negation, 5

proposition, 3, 4

quantifier, 16

tautology, 10

truth value, 3

universal quantifier, 17

裏, 15

かつ, 6

偽, 3

逆, 15

吸収律, 8

系, 4

結合律, 8

限定記号, 16

交換律, 8

恒真式, 10

十分条件, 15

述語, 16

条件, 16

証明, 4

証明する, 4

真, 3

真理値, 3

真理値表, 6

選言, 7

全称記号, 17

全称命題, 16

束, 8

存在記号, 19

対偶, 15

定理, 4

でない, 5

同値, 8

同値変形, 12

トートロジー, 10

ド・モルガンの法則, 8

ならば, 13

排他的論理和, 7

排中律, 5, 8

背理法, 5

反射律, 8

必要十分条件, 15

必要条件, 15

否定, 5

ブール束, 8

分配律, 8

幂等律, 8

補題, 4

または, 7

矛盾, 5

無矛盾律, 5, 8

命題, 3

命題関数, 16

量称記号, 16

連言, 6

論理積, 6

論理和, 7